This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

Mo'i 275.2.45

HARVARD COLLEGE
LIBRARY

Bought from the Fund for
CURRENT MODERN POETRY
given by
MORRIS GRAY
CLASS OF 1877

Die

Bücher des Apollonius von Perga

DE SECTIONE RATIONIS

nach dem Lateinischen des

Edm. Halley

frey bearbeitet, und mit einem Anhange versehen

von

Dr. W. A. Diesterweg,

ordentlichem Professor der Mathematik an der königl. preuss. Rheinuniversität.

Mit 9 Steintafeln.

Berlin,

bey Georg Reimer.

1824.

Math. 275.2.45

1863, Aug. 28.
$0.94
Gray Fund.

Vorrede.

Von den Schriften des Apollonius von Perga gehörte die Schrift περὶ λόγου ἀπότομῆς zu den verloren gegangenen. Glücklicherweise fand sich in der Bodlejanischen Bibliothek eine arabische Uebersetzung derselben, welche, nachdem es mehreren Gelehrten mifslungen war, das Glück hatte, von dem berühmten Mathematiker, Edm. Halley, Professor zu Oxford, im Jahr 1706 in das Lateinische übersetzt zu werden. Sie ist eine vortreffliche Schrift, und verdient als ein Muster der geometrisch - analytischen Behandlung einer Aufgabe in allen ihren Fällen von jedem jungen Mathematiker studiert zu werden. Dafür bürgt das Zeugnifs des Alterthums, welches ihrem Verfasser den Nahmen des grofsen Geometers beilegte, und das Zeugnifs Neuton's, welcher sie mit dem Nahmen seiner Lieblingsschrift beehrte.

Ich übergebe sie hiermit dem mathematischen Publicum in Deutschland, in einer freyen Bearbeitung, nicht einer Uebersetzung; mit Zusätzen und einem Anhange über verwandte Aufgaben versehen. Um auch die Leser, welche die sehr seltene Halley'sche Uebersetzung nicht zur Hand haben, in den Stand zu setzen, über die Beschaffenheit des Originals und dieser Bearbeitung selbst zu urtheilen, so lasse ich der Vorrede einen Hauptfall nach der Halley'schen Ausgabe beydrucken.

Um die Anordnung systematischer zu machen, habe ich den Gang des Originals nicht überall beybehalten. Defshalb findet man loc. X. (Apollonius bezeichnete die Hauptfälle der behandelten Aufgabe mit τόπος, locus) nach loc. XIV. abgehandelt.

Ich füge der Vorrede eine Uebersicht des Inhaltes bey.

Bonn, im Dec. 1823.

Diesterweg.

Apollonii Pergaei de Sectione rationis Lib. II. Locus Tertius.

Occurrat jam recta, per punctum H ducta ipsique AΓ parallela, rectae alteri MB citra punctum Z; sive inter illud ac punctum M, ad modum rectae HK: ac manifestum est rectas duci posse per punctum H, juxta quinque diversos Casus.

Cas. I. (Fig. 1.) Ducatur autem imprimis recta AB, juxta Casum primum, auferens segmenta ΓA ad BZ in ratione data. Junge ΓH; ac per punctum Θ ducatur recta ipsi ΓA parallela, ut recta ΣΘO. Quoniam ratio ΓH ad HΘ datur, ratio ΓA ad ΔΘ data est. Cumque ratio ΓA ad BZ data est, dabitur quoque ratio ΔΘ ad ZB. Sunt autem rectae duae positione datae, ΣO, MB; ac sumitur in recta MB punctum Z, in recta autem ΣO punctum Θ; datum autem punctum H est intra angulum OΘB. Ducenda est igitur recta AHB, auferens rationem ΔΘ ad ZB datam. Recta autem AHB positione datur, juxta Casum primum Loci septimi, neque habet limites. Construetur autem per ea quae ibidem docentur.

Cas. II. (Fig. 2. 3.) Ducatur recta AB, juxta Casum secundum, auferens rationem ΓA ad BZ datam. Manentibus autem descriptis, cum ratio ΓA ad ΔΘ data est, atque etiam ratio ΘΔ ad ZB datur, recta quoque AB dabitur positione, per Casum secundum Loci septimi.

Determinatur autem hunc in modum. Capiatur ΘB media proportionalis inter ipsas ZΘ, ΘK; junctâque HB ac productâ ad A, dico quod recta AB aufert rationem ΓA ad BZ, minorem quavis alia ratione, quae resecari possit à rectis per punctum H ductis, ipsique KZ occurrentibus. Ducatur enim alia, ut ΔHN. Cumque recta ΘB media proportionalis est inter ZΘ, ΘK; erit ratio ΣΘ ad BZ minor ratione OΘ ad ZN: ac permutando, erit ratio ΣΘ ad ΘO minor ratione BZ ad ZN. Sed ΣΘ est ad ΘO ut AΓ ad ΓΔ; adeoque ratio AΓ ad ΓΔ minor erit ratione BZ ad ZN: quare permutando, ratio AΓ ad BZ minor erit ratione ΓΔ ad ZN. Recta igitur AB aufert rationem AΓ ad BZ minorem qualibet ratione, à rectis per H transeuntibus rectaeque KZ occurrentibus, abscissâ.

Componetur autem problema hunc in modum. Manentibus jam descriptis; sit ΘB media proportionalis inter rectas ZΘ, ΘK; junctaque HB producatur ad A. Dico quod recta AB auferet rationem ΓA ad BZ, minorem quavis aliâ ratione, quam abscindere potest recta quaevis alia per punctum H ducta, ipsique KZ occurrens. Quod si ratio ad construendum proposita aequalis fuerit rationi ΓA ad ZB; tum recta AB sola solvit problema; si minor fuerit eâ, compositio fieri non potest. Si vero major fuerit eâ,

componetur duobus modis, ab utrâque parte ipsius AB. Sit autem (Fig. 3) ratio data sicut N ad T, quae major sit ratione ΓA ad BZ. Fiat ut ΓH ad HΘ ita N ad Ξ: ac manifestum est ex aequo, quod ratio Ξ ad T major erit ratione ΘΣ ad BZ. Sed ratio ΘO ad NZ major est eâ; quia ΘB media proportionalis est inter ZΘ et ΘK: unde constat rectas duas duci posse, per punctum H, ab utraque parte ipsius AB, quae secent à rectis ΘΣ, ZK, rationes aequales rationi Ξ ad T. Constat autem ex praemissis rectas hunc in modum ductas solvere problema.

Cas. III. (Fig. 4.) Ducatur jam, juxtà Casum tertium, recta auferens rationem ΓE ad AZ datam. Quoniam ratio EΓ ad BΘ datur, ac ratio quoque BΘ ad AZ data est; recta EH positione datur: per Casum tertium Loci septimi, qui quidem non habet limites, adeoque manifesta est compositio.

Cas. IV. (Fig. 5. 6. 7. 8.) Ducatur jam, ad modum quartum, recta HN auferens rationem ΓN ad AZ datam. Quoniam ratio ΓN ad ΘΣ datur, etiam ratio ΣΘ ad AZ data est; unde recta HN positione datur. Reducitur enim ad Casum quartum Loci septimi.

Determinatur autem problema hunc in modum. Manentibus prius descriptis; capiatur media proportionalis inter ZΘ et ΘK. Haec vel minor erit recta ΘM, vel non minor eâ: ac primo non sit minor eâ. Junge HM, ac dico quod recta HM aufert rationem ΓM ad MZ, majorem quavis ratione, a rectâ qualibet per punctum H ductâ ipsique ΓM occurrente, abscissa. Ducatur enim alia ut HN. Quoniam me-

auferant à rectis ΓM, MZ rationem aequalem rationi Ξ ad T. Hae si ducantur, cadent ab utraque parte ipsius HM; ac manifestum est alteram ex his rectis ut HO, quae per punctum H transit ac producta occurrit ipsi ΓM, solvere problema; alteram vero non item: adeoque unico tantum modo efficitur. Q. E. D.

Jam sit (Fig. 8.) media proportionalis inter ZΘ et ΘK minor quam recta ΘM; sit ea ΘN. Junge rectas HM, HN; et producatur HN ad Σ; ac recta haec HΣ auferet rationem ΓΣ ad NZ, majorem quavis, quae resecari possit à rectis per punctum H ductis, ipsique ΓM occurrentibus. Recta vero HM auferet rationem ΓM ad MZ, minorem quavis ratione à rectis per H ductis, ipsique ΣM soli occurrentibus, abscissâ. Propositâ autem ratione construendâ, quae aequalis sit rationi ΓΣ ad NZ; manifestum est quod sola recta HΣ solvet problema. Si ratio proposita major fuerit ea, tum componi non potest. Quod si minor fuerit ratione ΓΣ ad NZ, major vero quam ΓM ad MZ; hoc in casu dupliciter solvi potest problema per praecedentia: à rectis scilicet ab utrâque parte ipsius HΣ ducendis, ipsisque ΓΣ, ΣM occurrentibus. Quod si ratio data aequalis fuerit rationi ΓM ad MZ; constat etiam ex determinatione praemissâ, quod duobus modis solvi possit, nempe rectâ HM, ac rectâ aliâ ut HP. Si vero ratio minor fuerit quam ΓM ad MZ; tum cadet altera è rectis ultra ipsam HM, adeoque non satisfaciet problemati. Manifesta autem sunt haec omnia ex iis quae jam pridem demonstravimus.

Cas. V. (Fig. 9. 10.) Ducatur jam recta HΛ, juxta Casum quintum, auferens rationem ΓΔ ad ΛZ datam. Quoniam ratio ΓΔ ad ΘN datur, ratio etiam NΘ ad ΛZ datur; unde recta quoque HΛ positione data est, per demonstrata in Casu quarto Loci septimi, qui quidem determinationem habet. Determinatur autem hunc in modum. Quoniam media proportionalis inter ZΘ, ΘK, vel major esse potest quam recta ΘM, vel minor eâ; primum non sit major eâ. Junge HM, ac manifestum est ex limitationibus praecedentibus, quod recta HM auferet rationem ΓM ad MZ majorem rationibus omnibus, à rectis per punctum H ductis rectaeque ΛM occurrentibus, abscissis. Si vero media proportionalis inter ZΘ, ΘK major sit quam recta ΘM; ut est recta ΘΛ: jungantur HΛ, HM; ac patet ex limitationibus praecedentibus, quod recta HΛ auferet rationem ΓΔ ad ΛZ, majorem omni ratione, quam auferunt rectae quaevis per H ductae, ipsique ΛMΘ occurrentes. Recta vero HM auferet rationem ΓM ad MZ, minorem quavis ratione, à rectis per H ductis, solique rectae ΛM occurrentibus, abscissâ. Q. E. D.

Componetur autem problema hunc in modum. Manentibus jam descriptis, erit media proportionalis inter ZΘ et ΘK, vel major quam ΘM, vel non major ea. Primo autem non sit major eâ. Junge HM auferentem rationem ΓM ad MZ, majorem omni ratione, à rectis per H ductis, ipsique ΛM occurrentibus, abscissâ: ac si fuerit ratio ad componendum data ut ΓM ad MZ, sola recta HM solvit problema. Si major fuerit eâ, tum construi non potest. Quod si ratio minor fuerit eâ, ex praecedentibus constat

unam solam rectam duci posse, quae occurrens ipsi ΛM problemati satisfaciat. Q. E. D.

Quod si ΘΛ, media proportionalis inter ZΘ et ΘK, major fuerit quam ΘM; jungantur HM, HΛ; ac recta HΛ auferet rationem ΓΔ ad ΛZ, majorem omni ratione quam abscindunt rectae aliae per H ductae, ipsique ΘM continuatae occurrentes: recta vero HM auferet rationem minimam, nempe rationem ΓM ad MZ. Jam si proponatur ratio ad construendum, quae fuerit ut ΓΔ ad ΛZ; patet quod recta HΛ sola solvet problema: ac si major fuerit ratio, non construetur. Quod si minor fuerit ratione ΓΔ ad ΛZ, major vero quam ΓM ad MZ, manifestum est ex praemissis, problema effici posse duobus modis; ductis rectis, ab utraque parte ipsius HΛ, rectae ΛM occurrentibus. Si vero minor fuerit ratione ΓM ad MZ, ex praecedentibus limitationibus constat, unico solum modo solvi posse problema; scilicet recta ipsam ΛM intersecante. Denique si ratio aequalis fuerit rationi ΓM ad MZ, duplicem habebit solutionem. Recta enim HM, atque etiam alia ipsi ΛM occurrens ultra punctum Λ, rem praestant. Totum hoc patet ex prius demonstratis.

so ist $HO : OL = DH : \begin{cases} HQ \text{ (El. VI. 4.)} \\ AO \text{ (El. I. 34.)} \\ \frac{1}{4}AB \end{cases}$

also mufs $OH \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} HD$ seyn (El. V. 14.)

folglich $OH^2 \left\} \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right. \begin{cases} HD^2 \\ \frac{1}{4}DE^2 \text{ (El. VI. 2.)} \\ \frac{EN^2+ND^2}{4} \text{ (El. I. 47.), wenn } EN \# AB, \\ \frac{AB^2+(AD-BE)^2}{4} \text{ (El. I. 34.)} \end{cases}$

(El. Ax. 1.) $\frac{(AD+BE)^2}{4}$

mithin $(AD+BE)^2 \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} AB^2+(AD-BE)^2$

somit $(AD+BE)^2-(AD-BE)^2 \left\} \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right. AB^2$

(El. II. 4. 7.) $4AD.BE$

demnach $AD.BE \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \frac{1}{4}AB^2$

Beweis.

Es ist $AD.BE \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \frac{1}{4}AB^2$ (Det.)

also $4AD.BE \left\} \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right. AB^2$

$(AD+BE)^2-(AD-BE)^2$

folglich $\frac{(AD+BE)^2}{4} \left\} \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right. \begin{cases} \frac{AB^2+(AD-BE)^2}{4} \\ \frac{EN^2+ND^2}{4} \\ \frac{1}{4}DE^2 \\ HD^2 \end{cases}$

OH^2

Lehnsatz A. Aufgabe. (Fig. a.)

Eine gegebene gerade Linie AB in einem Punkte C so zu schneiden, dafs das Rechteck aus den Segmenten AC, CB dem Rechtecke aus zwey gegebenen geraden Linien P, Q gleich sey.

Auflösung.

Man mache $BAD = ABE = R$ auf einerley Seite von AB, $AD = P$, $BE = Q$, ziehe DE, beschreibe über AB als Durchmesser einen Kreis, und errichte auf der Linie DE in dem Punkte F, in welchem der Kreis diese Linie erreicht, ein Perpendikel. Der Punkt C, in welchem dasselbe der Linie AB begegnet, wird das Verlangte leisten.

Determination.

Damit der Halbkreis der Linie DE begegne, mufs (Fig. a. 2.) ein von dem Mittelpunkte O auf DE gefälltes Perpendikel $OL \leqq \frac{1}{2}AB$ seyn. (El. I. 19.)

Macht man $AOH = R$, und zieht durch den Durchschnitt H der OH mit DE die Linie $HQ \# AB$,

bb.) auf KE. (loc. XII. Fig. 84 — 89.)

cc.) auf der Verlängerung von KE. (loc. XIII. Fig. 90 — 92.)

3.) auf KI. (loc. XIV. Fig. 93 — 98.)

γ.) auf Ia. Der auf CD gegebene Punkt liegt

א.) auf IC. (loc. IV. V. VI.)

ב.) auf ID. (loc. IX. XIV. X.)

1.) in K. (loc. IX.)

2.) auf der Verlängerung von IK. (loc. XIV.)

3.) auf IK. (loc. X. Fig. 99 — 104.)

ב.) auf der Verlängerung von IK. (loc. III. Fig. 40—49.)

ג.) auf IK. (loc. IV — VI.)

1.) zwischen E, K, wenn E der Durchschnitt der Linien OF, CD ist. (loc. IV. Fig. 50 – 60.)

2.) zwischen E, I. (loc. V. Fig. 61 — 65.)

3.) in E. (loc. VI. Fig. 66 – 69.)

2.) auf IA. (loc. VII — XIV.)

α.) in a, wenn a der Durchschnitt der Linie Oa (∦ CD) mit AB ist. Der auf CD gegebene Punkt liegt

א.) auf IC. (loc. II.)

ב.) auf ID. (loc. VII — IX.)

1.) in K. (loc. VII. Fig. 70 — 72.)

2.) auf der Verlängerung von IK. (loc. VIII. Fig. 73 — 75.)

3.) auf KI. (loc. IX. Fig. 76 — 79.)

β.) auf der Verlängerung von Ia. Der auf CD gegebene Punkt liegt

א.) auf IC. (loc. III.)

ב.) auf ID. (loc. VIII. XI — XIV.)

1.) in K. (loc. VIII.)

2.) auf der Verlängerung von IK. (loc. XI – XIII.)

aa.) in E (loc. XI. Fig. 80 – 84.), wenn E der Durchschnitt der Linien OF, CD ist.

A.) nicht zwischen den gegebenen Linien. (loc. I. Fig. 1 - 3.)

B.) zwischen — — — (loc. II. Fig. 4—7.)

II.) Die gegebenen Linien AB, CD sind nicht parallel. (lib. I. loc. III — VII. lib. II. loc. I — XIV.) Die in denselben gegebenen Punkte liegen

A.) beide im Durchschnittspunkte. (lib. I. loc. III. Fig. 8 - 11.)

B.) nicht beide im Durchschnittspunkte E. (lib. I. loc. IV—VII. lib. II. loc. I — XIV.)

a.) Der auf AB gegebene Punkt liegt in E (lib. I. loc. IV - VII.), der auf CD gegebene

α.) auf EC. (lib. I. loc. IV. Fig. 12. 13.)

β.) auf ED. (lib. I. loc. V — VII.)

ℵ.) in K, wenn OK∥AB. (lib. I. loc. V. Fig. 14 - 16.)

ב.) zwischen E, K. (lib. I. loc. VI. Fig. 17 — 21.)

ג.) auf der Verlängerung von KE. (loc. VII. Fig. 22—26.)

b.) Keiner liegt im Durchschnittspunkt I. (lib. II.) Der auf AB gegebene Punkt liegt

a.) auf IB (loc. I—VI.), der auf CD gegebene

α.) auf IC. (loc. I. Fig. 27 — 29.)

β.) auf ID. (loc. II — VI.)

ℵ.) in K. (loc. II. Fig. 30 — 39.)

Inhaltsanzeige.

Die Bücher des Apollonius de sectione rationis enthalten die Bearbeitung folgender Aufgabe:

» Von einem, ausserhalb zweyer der Lage nach gegebenen ge-
» raden Linien, in der durch dieselben bestimmten Ebe-
» ne, gegebenen Punkte eine gerade Linie zu ziehen, so
» dass die zwischen ihren Durchschnittspunkten mit jenen
» Linien und zweyen in denselben gegebenen Punkten
» liegenden Segmente ein gegebenes Verhältniss zu einan-
» der haben «

und behandeln dieselbe in folgender Ordnung.

I.) Die gegebenen Linien sind parallel. (lib. I. loc. I. II.) Der gegebene Punkt liegt

mithin $OH \gtrless HD$

Nun ist $HO : OL = DH : \begin{cases} HQ \\ AO \end{cases}$

demnach $LO \gtrless \begin{cases} OA \\ \frac{1}{2}AB \end{cases}$

Der Halbkreis berührt also (Fig. a. 1.), oder schneidet (Fig. a. 2.) die Linie DE. In beiden Fällen ist $AFB = R$ (El. III. 31.)

also $AFD < R, \quad BFD > R$

folglich $DFC > DFA, \quad DFC < DFB$

mithin fällt FC zwischen AF, FB

somit liegt C zwischen A, B.

Ferner ist $DAF = CBF$ (El. III. 32.), $DFC = AFB$

demnach $AFD = CFB$

folglich $DA : AF = CB : BF$ (El. VI. 4.)

Auch ist $EBF = FAC$ (El. III. 32.), $EFC = AFB$

somit $EFB = AFC$

folglich $FA : AC = FB : BE$

mithin $DA : AC = CB : BE$ (El. V. 22.)

demnach $AC.CB = \begin{cases} AD.BE \\ P.Q \end{cases}$ (El. VI. 16.)

Zus. Es erhellet von selbst (Fig. a. 2.), dafs ein zweiter Durchschnitt des Halbkreises mit der Linie DE einen zweiten Punkt C′ mit der gegebenen Eigenschaft auf der Linie AB bestimme.

Lehns. B. Aufg. (Fig. b.)

Auf der Verlängerung einer gegebenen geraden Linie AB einen Punkt C zu bestimmen, so dafs das Rechteck aus den Segmenten AC, CB dem Rechtecke aus zwey gegebenen geraden Linien P, Q gleich sey.

Auflösung.

Man mache $BAD = ABE = R$ auf verschiedenen Seiten der Linie AB, $AD = P$, $BE = Q$, ziehe DE, beschreibe über AB als Durchmesser einen Kreis, und errichte in dem Punkte F, in welchem derselbe die Linie DE schneidet, ein Perpendikel auf DE. Der Punkt, in welchem dasselbe die Verlängerung von AB erreicht, wird das Verlangte leisten.

Beweis.

Es ist $DFC = R$, $DFB < R$ (El. III. 31.)

also $DFC > DFB$

folglich liegt C in der Verlängerung von AB.

Ferner ist $DAF = CBF$ (El. III. 32. 22.), $DFC = AFB$

also $AFD = CFB$

folglich $DA : AF = CB : BF$

Auch ist $EBF = FAC$, also $EFC = AFB$

$EFB = AFC$

folglich $FA : AC = FB : BE$

mithin $DA : AC = CB : BE$

somit $AC \cdot CB = \begin{cases} AD \cdot BE \\ P \cdot Q \end{cases}$

Zus. Es erhellet von selbst, dafs der zweite Durchschnitt F des Kreises mit DE einen zweiten Punkt C′ auf der verlängerten BA bestimme, welcher das Verlangte leistet.

Die

BÜCHER des APOLLONIUS von PERGA

de sectione rationis.

Aufgabe.

Von einem, aufserhalb zweyer der Lage nach gegebenen geraden Linien, in der durch dieselben gelegten Ebene, gegebenen Punkte eine gerade Linie zu ziehen, so dafs die zwischen ihren Durchschnittspunkten mit jenen Linien und zweyen in denselben gegebenen Punkten liegenden Segmente ein gegebenes Verhältnifs zu einander haben.

Erstes Buch.

Die gegebenen Linien sind parallel, oder es liegen, wenn sie nicht parallel sind, die in denselben gegebenen Punkte nicht beide aufserhalb ihres Durchschnittspunktes. (Fig. 1—26.)

I) Die gegebenen Linien AB, CD sind parallel. (Fig. 1—7.) Die gegebenen Punkte seyen E, F.

1) Der aufserhalb der Linien gegebene Punkt O liegt innerhalb des Winkels DFR. (Fig. 1—3.). (Loc. I.)

Fall 1.

Die verlangten Segmente sollen liegen auf den Linien FD, EB. (Fig. 1.)

Analysis.

Es sey OG die gesuchte Linie, ihre Durchschnittspunkte mit AB, CD seyen G, H, so ist, wenn die gerade Linie OE gezogen wird, welche die Linie CD in L schneide,

$EG : LH = EO : OL$ (El. VI. 4.)

also ist $EG : LH$ gegeben (Dat. 29. 1.) *)

Da $EG : FH$ gegeben ist (p. hyp.)

so ist $FH : HL$ (Dat. 9.)

folglich auch $FH - HL : LH$ gegeben (Dat. 6. *Zus.*)

mithin ist LH (Dat. 2.)

somit der Punkt H (Dat. 30.), und die gerade Linie OH der Lage nach (Dat. 29.) gegeben.

Determination.

Da $FH > HL$

so ist $EG : FH < \begin{cases} EG : HL & \text{(El. V. 8.)} \\ EO : OL \end{cases}$

also muſs das gegebene Verhältniſs $p : q < EO : OL$ seyn.

Construction.

Man ziehe EF, mache $OK \# CD$, $UF = FK$, $UV \# EF$, $TE = EV$, $FP = p$, $FQ = q$, $QR \# TP$, $LM \# EF$, ziehe RM, welche in H die CD schneide, so ist OH die gesuchte Linie.

Beweis.

Es ist $p : q \left\} < \begin{cases} EO : OL & \text{(Det.)} \\ EK : KF & \text{(El. VI. 2.)} \end{cases} \right.$

(El. VI. 4.) $\left.\begin{matrix} TF \\ EK \end{matrix}\right\} : FR$

also $RF > \begin{cases} FK & \text{(El. V. 10.)} \\ LM \end{cases}$

*) Die Citationen der Data des Euclides beziehen sich auf die von Schwab, Stuttgart, 1780 veranstaltete deutsche Ausgabe.

folglich schneidet RM die Verlängerung von FL. Und es ist $EG : HL = EO : OL$ (El. VI. 4.)

$$= \left\{\begin{matrix} EK \\ TF \end{matrix}\right\} : KF \quad \text{(El. VI. 2.)}$$

Auch ist $LH : HF = LM : FR$ (El. VI. 4.)

mithin $EG : HF = TF : FR$ (El. V. 22.)

$$= p : q.$$

Zusatz 1. (Apoll.)

Für eine andere gerade Linie OW, welche die EB, LD in W, X schneide, ist

$$XH : HL > XH : HF \quad \text{(El. V. 8.)}$$

also $\left.\begin{matrix} LH \mp HX \\ XL \end{matrix}\right\} : LH \left.\begin{matrix} \\ \\ \end{matrix}\right\} \lessgtr \left\{\begin{matrix} FH \mp HX \\ XF \end{matrix}\right\} : FH$ (Proposit. de ration. inter se diversis demonstrat. ed. Hauber, Tubingae, 1793. §. 28. 19.)

(El. VI. 4.) $WE : EG$

folglich $WE : FX \lessgtr \left\{\begin{matrix} EG : FH \\ p : q \end{matrix}\right.$ (Hauber. §. 43.)

mithin bestimmen die dem Punkte F näher liegenden Punkte der Linie LD kleinere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zusatz 2.

Verlängert man ML, so dafs $M'L = LM$, und zieht RM', welche die Linie CD in H' schneide, so ist, wenn die die Linie AB in G' schneidende gerade Linie OH' gezogen wird, $EG' : H'L = EO : OL$

$$= \left\{\begin{matrix} EK \\ TF \end{matrix}\right\} : KF$$

Auch ist LH' : H'F = LM' : FR

also EG' : H'F = TF : FR
= p : q

mithin ist eine Linie OG' gefunden, welche von den Linien EA, FD Segmente in dem gegebenen Verhältnisse abschneidet, welches Fall 2. ist.

Fall 2.

Die verlangten Segmente sollen liegen auf den Linien EA, FD. (Fig. 2. a. b. c.)

Analysis.

Es sey OG die gesuchte Linie, ihre Durchschnitte mit AB, CD seyen G, H, so ist, wenn man die die Linie CD in L schneidende gerade Linie EO zieht, EG : LH = EO : OL (El. VI. 4.)

also ist EG : LH gegeben (Dat. 29. 1.)
Da EG : FH gegeben ist (p. hyp.)

so ist FH : HL (Dat. 9.)

also auch FH + HL : LH gegeben (Dat. 7.)

folglich ist LH (Dat. 2.), mithin der Punkt H (Dat. 30.), somit die gerade Linie OH der Lage nach gegeben (Dat. 29.)

Construction.

Man mache OK # CD, UF = FK, UV # EF # LM, TE = EV, FP = p, FQ = q, QR # TP, FM # KL, und ziehe RM, welche die CD in H schneide, so ist OHG die gesuchte Linie.

Beweis.

Es ist $EG : HL = EO : OL$ (El. VI. 4.)

$= \left\{\begin{matrix} EK \\ TF \end{matrix}\right\} : KF$ (El. VI. 2.)

Auch ist $LH : HF = LM : FR$ (El. VI. 4.)

---

also $EG : HF = TF : FR$ (El. I. 34. V. 22.)

$= p : q$

Zus. 1. (Apoll.)

Für eine andere gerade Linie OW, welche die Linien EA, FL in W, X schneide, ist

$$WE \gtrless EG \qquad XF \lessgtr FH$$

---

also $WE : FX \gtrless \left\{\begin{matrix} EG : FH \\ p : q \end{matrix}\right.$ (Hauber §. 10. 43.)

folglich bestimmen die dem Punkte F näher liegenden Punkte der Linie FL gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Verlängert man ML bis zum Durchschnitt mit OK in M', und zieht OM', so bestimmt, wenn nicht, wie Fig. 2. c., $RM' \# CD$, d. h. wenn nicht

$$\left.\begin{matrix} TF : FR \\ PF : FQ \\ p : q \end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix} TF : LM' \\ EK : KF \\ EO : OL \end{matrix}\right.$$

OG' zwey andere Segmente EG', F'H auf den Linien EB, FD (Fig. 2. a.), oder auf den Linien EA, FC (Fig. 2. b.) mit der gegebenen Eigenschaft, welches Fall 1., oder Fall 3. ist.

Fall 3.

Die verlangten Segmente sollen liegen auf den Linien EA, FC (Fig. 3.)

Analysis.

Es sey OG die gesuchte Linie, ihre Durchschnittspunkte mit AB, CD seyen G, H, so ist, wenn die die Linie CD in L schneidende gerade Linie OE gezogen wird,

EG : LH = EO : OL (El. VI. 4.)

also ist EG : LH gegeben (Dat. 29. 1.)

Da EG : FH gegeben ist (p. hyp.)

so ist FH : HL (Dat. 9.)

folglich auch LH—HF : FH gegeben (Dat. 6. Zus.)

mithin ist FH (Dat. 2.), somit der Punkt H (Dat. 30.), und die gerade Linie OH der Lage nach gegeben (Dat. 29.).

Determination.

Da FH < HL

so ist EG : FH > { EG : HL (El. V. 8.) / EO : OL (El. VI. 4.)

also muſs p : q > EO : OL seyn.

Construction.

Buchstäblich, wie zu Fall 1.

Beweis.

Es ist p : q } > { EO : OL (Det.)
PF : FQ } > { EK : KF (El. VI. 2.)
(El. VI. 4.) TF } : FR }
EK }

also RF < { FK } (El. V. 10.)
{ LM }

folglich schneidet MR die Verlängerung von LF. Und es ist $EG : HL = EO : OL$

$$= \left\{\begin{matrix} EK \\ TF \end{matrix}\right\} : KF$$

Auch ist $LH : HF = LM : FR$

---

mithin $EG : HF = TF : FR$

$$= p : q$$

Zus. 1. (Apoll.)

Für eine andere gerade Linie OW, welche die EA, FC in W, X schneide, ist

$$XH : HL < XH : HF \quad \text{(El. V. 8.)}$$

---

also $LH \pm HX : LH \left\{\begin{matrix} < \\ = \\ > \end{matrix}\right\} FH \pm HX : FH$ (Hauber §. 19. 22.)

(El. VI. 4.) $WE : EG$

---

folglich $WE : FX \left\{\begin{matrix} < \\ = \\ > \end{matrix}\right\} EG : FH$ (Hauber §. 43.)

$p : q$

mithin bestimmen die dem Punkte F näher liegenden Punkte der Linie FC gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Buchstäblich, wie Fall 1. Zus. 2.

Anm. zu loc. I.

Die in loc. I. enthaltene Aufgabe kann also, wenn das gegebene Verhältnifs $p : q \left\{\begin{matrix} < \\ = \\ > \end{matrix}\right\} EO : OL$ nach Fall $\left\{\begin{matrix} 1.\ 2. \\ 2. \\ 2.\ 3. \end{matrix}\right\}$ aufgelöfst werden.

2) Der Punkt O liegt innerhalb der Winkel BEF, EFD. (Fig. 4—6.) (Loc. II.)

Fall 1.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien EB, FD. (Fig. 4. a. b. c.)

Anal. } Buchstäblich, wie zu loc. I. Fall (2.)
Constr. } (1.)
Bew. } (2.)

Zus. 1. (Apoll.)

Buchstäblich, wie Fall 2. Zus. 1.

Zus. 2.

Macht man auch LM' = LM, und zieht RM', so schneidet dieselbe, wenn nicht RM' # FD, d. h. wenn nicht TF : FR } = TF : LM', wie Fig. 4. c.,
PF : FQ } = EK : KF
p : q } = EO : OL
die Linie CD in einem Punkte H', und die gerade Linie OH' bestimmt zwey Segmente EG', FH' auf den Linien EA, FD (Fig. 4. a.), oder auf den Linien EB, FC (Fig. 4. b.) mit der gegebenen Eigenschaft, welches Fall 2., oder Fall 3. ist.

Fall 2.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien EA, FD. (Fig. 5.)

Anal. Det. } Buchstäblich, wie zu loc. I. Fall (1.)
Constr. } (2.)
Bew. } (1.)

Zus. 1.

Für eine andere gerade Linie OW, welche die Linien EA, FD in W, X schneide, ist

$XH : HL > XH : HF$

u. s. w. wie loc. I. Fall 1. Zus. 1.

Zus. 2.

Buchst. wie loc. I. Fall 1. Zus. 2. wird eine Linie OG' gefunden, welche von den Linien EB, FD Segmente in dem gegebenen Verhältnisse abschneidet, welches Fall 1. ist.

Fall 3.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien EB, FC. (Fig. 6.)

Anal.	Buchstäblich, wie zu loc. I. Fall	3.
Det.		3.
Constr.		2.
Bew.		3.

Zus. 1. (Apoll.)

Für eine andere gerade Linie OW, welche die Linien EB, FC in W, X schneide, ist

$XH : HL < XH : HF$

u. s. w. wie loc. I. Fall 3. Zus. 1.

Zus. 2.

Buchst. wie zu loc. I. Fall 2. Zus. 2.

Anm. zu loc. II.

Die in loc. II. enthaltene Aufgabe kann also, wenn das gegebene Verhältniss $p : q \left\{ \begin{matrix} = \\ > \\ < \end{matrix} \right\} EO . OL$ nach Fall $\left\{ \begin{matrix} 1. \\ 1.\ 3. \\ 1.\ 2. \end{matrix} \right\}$ aufgelöst werden.

Anm. zu I. (Halley). (Fig. 7.)

Wenn AB, CD zwey der Lage nach gegebene parallele Linien, E, F in denselben gegebene Punkte sind, auch p : q ein gegebenes Verhältnifs bezeichnet, und man macht EP = p, QF = q, zieht PQ, welche die gerade Linie EF, oder ihre Verlängerung in S schneide, zieht auch durch S und einen aufserhalb, oder innerhalb der Parallelen gegebenen Punkt O die gerade Linie SO, welche die Parallelen in H, G schneide, so ist

$$EG : FH = ES : SF \quad \text{(El. VI. 4.)}$$
$$= EP : FQ \quad \text{(El. VI. 4.)}$$
$$= p : q$$

Sämmtliche unter I. begriffene Fälle lassen sich also auch auf diesem Wege behandeln. Auch wird ESS in den mittleren Punkten F, S harmonisch geschnitten.

II.) Die gegebenen Linien sind nicht parallel. (Fig. 8—27.)

1) Die in beiden Linien gegebenen Punkte liegen im Durchschnittspunkte. (Fig. 8—11.). (Loc. III.)

Fall 1.

Die gesuchten Segmente sollen liegen auf den Linien CE, EA. (Fig. 8.)

Analysis:

Es sey OG die gesuchte gerade Linie, so ist, wenn eine durch O der AB parallel gezogene gerade Linie OK der Linie CD in K begegnet,

$$OK : KG = HE : EG \quad \text{(El. VI. 4.)}$$
$$= p : q$$

also ist das Verhältnifs $OK : KG$ ein gegebenes. Da OK (Dat. 31. 22.) der Lage und Gröfse nach gegeben ist, so ist KG (Dat. 2.) der Gröfse nach, somit der Punkt G (Dat. 30.), und die gerade Linie OG der Lage nach gegeben (Dat. 29.).

Determination.

Da $GK > KE$

so ist $OK : KG < OK : KE$ (El. V. 8.)

also mufs $p : q < OK : KE$ seyn.

Construction.

Man mache $OK \# AB$, $EP = p$, $EQ = q$, $OG \# PQ$, so sind, wenn der Durchschnitt der Linien AB, OG mit H bezeichnet wird, HE, EG die gesuchten Segmente.

Beweis.

Es ist $\left.\begin{matrix} p : q \\ PE : EQ \\ \text{(El. VI. 4.)}\ OK : KG \end{matrix}\right\} < OK : KE$ (Det.)

also $KG > KE$ (El. V. 10.)

Der Punkt G liegt mithin auf der Linie EC.

Ferner ist $HE : EG = PE : EQ$
$= p : q$

Zus. (Apoll.)

Für eine andere die Linien EC, EA in L, M schneidende gerade Linie OL ist $LK \left\{\begin{matrix} \geq \\ < \end{matrix}\right\} KG$

$$\text{also } \left.\begin{matrix} OK : KL \\ ME : EL \end{matrix}\right\} \lesseqgtr \left\{\begin{matrix} OK : KG \\ HE : EG \end{matrix}\right. \quad \text{(El. V. 8.)}$$

Die dem Punkte E näher liegenden Punkte der Linie CE bestimmen mithin gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Fall 2.

Die gesuchten Segmente sollen liegen auf den Linien DE, EB. (Fig. 9.)

Analysis.

Buchstäblich, wie zu Fall 1.

Determination.

Da $GK < KE$

so ist $OK : KG > OK : KE$ (El. V. 8.)

also mufs $p : q > OK : KE$ seyn.

Construction.

Buchst., wie zu Fall 1.

Beweis.

$$\text{Es ist } \left.\begin{matrix} p : q \\ PE : EQ \end{matrix}\right\} > OK : KE$$

$$\text{(El. VI. 4.) } OK : KG$$

also $KG < KE$

Der Punkt G liegt mithin auf der Linie KE. Ferner ist $HE : EG = PE : EQ$

$= p : q$

Zus. (Apoll.)

Für eine andere die Linien ED, EB in L, M schneidende gerade Linie OM ist $LK \gtrless KG$

also $OK : KL \gtrless OK : KG$ (El. V. 8.)
$ME : EL \gtrless HE : EG$

Die dem Punkte E näher liegenden Punkte der Linie EK bestimmen also kleinere Verhältnisse, als die entfernteren.

Fall 3.

Die gesuchten Segmente sollen liegen auf den Linien AE, ED. (Fig. 10.)

Analysis. Construction.

Buchstäblich, wie zu Fall 1.

Beweis.

Es ist $HE : EG = PE : EQ$
$= p : q$

Zus. (Apoll.)

Für eine andere die Linien AE, ED in M, L schneidende gerade Linie OL ist $LK \lessgtr KG$

also $OK : KL \lessgtr OK : KG$ (El. V. 8.)
$ME : EL \lessgtr HE : EG$

Die dem Punkte E näher liegenden Punkte der Linie KD bestimmen mithin gröfsere Verhältnisse, als die entfernteren.

Anm. zu loc. III. (Apoll.)

Die in loc. III. enthaltene Aufgabe kann also, wenn das gegebene Verhältnifs $p : q \left\{ \begin{matrix} < \\ > \\ = \end{matrix} \right\} OK : KE$, nach Fall $\left\{ \begin{matrix} 1.\ 3. \\ 2.\ 3. \\ 3. \end{matrix} \right\}$ aufgelöfst werden.

Anm. zu loc. III. (Halley.). (Fig. 11.)

Die 3 Fälle dieser Aufgabe lassen sich auch folgendermafsen behandeln.

Construction.

Man mache $EP = p$, $QE = Q'E = q$, ziehe PQ, PQ', $OG \# PQ$, $OG' \# PQ'$.

Beweis.

Es ist, wenn H, H' die Durchschnittspunkte der Linien AB, und OG, OG' sind,

$$HE : EG = PE : EQ = p : q \quad , \quad H'E : EG' = PE : EQ' = p : q$$

2) Der in der Linie AB gegebene Punkt ist der Durchschnittspunkt E der Linien AB, CD, (Fig. 12—26.). Der in der Linie CD gegebene Punkt F liegt

A.) auf der Linie EC. (Fig. 12—14.) (Loc. IV.)

Fall 1.

Die gesuchten Segmente sollen liegen auf den Linien AE, FC. (Fig. 12.)

Analysis.

Es sey HG die gesuchte Linie. Macht man OK#AB, und OK : FS=p : q
=HE : FG

so ist $\left.\begin{matrix} OK : HE \\ KG : GE \end{matrix}\right\} = SF : FG$

also GK : KE=FS : SG

folglich KG.GS=KE FS (El. VI. 16.)

Da KE (Dat. 28.), FS (Dat. 2) gegeben sind, so ist KG. GS der Gröfse nach, und da KG+GS=KF+FS=KS gegeben ist, so ist KG (Dat. 86.), somit G (Dat. 30.) und die Lage der geraden Linie OG gegeben (Dat. 30.).

Construction.

Man mache FN#OK#AB, ON#CD, FP=p, FQ=q, NS#PQ, FST=R=EKU, TS=SF, UK=KE, beschreibe über SK als Durchmesser einen Kreis, welcher der geraden Linie TU in R begegne, mache TRG=R, und ziehe durch O und den Durchschnitt G der Linie RG mit CD eine gerade Linie OG, welche AB in H schneide, so wird OG das Verlangte leisten.

Beweis.

Es ist FS<SE (p. hyp.)

also FS.EK<SE.EK (El. VI. 1.)

folglich FS.EK<$\frac{1}{4}$SK² (El. II. 5.)

mithin schneidet der über KS beschriebene Halbkreis die Linie TU. (Lehns. A.)

Es ist $\left.\begin{array}{l} SG.GK \\ S\alpha^2-\alpha G^2 \end{array}\right\} < \left\{\begin{array}{l} SE.EK \quad \text{(El. VI. 1.)} \\ S\alpha^2-\alpha E^2 \quad \text{(El. II. 5.)}, \text{ wenn } S\alpha=\alpha K \end{array}\right.$
(Lehns. A)

folglich $G\alpha^2 > \alpha E^2$

mithin $G\alpha > \alpha E$

somit $GK > KE$

demnach $FS > SG$ (El. VI. 16.)

Der Punkt G liegt mithin zwischen S, F.

Ferner ist $GK : KE = FS : SG$

also $\left.\begin{array}{l} KG : GE \\ OK : HE \end{array}\right\} = SF : FG$

somit $\left.\begin{array}{l} \left.\begin{array}{l} OK \\ NF \end{array}\right\} : FS \\ PF : FQ \\ p : q \end{array}\right\} = HE : FG$

Zus. 1. (Apoll.)

Für eine andere die Linien FS, EA in M, L schneidende gerade Linie OM ist

$KE < KF$

mithin $\left.\begin{array}{l} KE.FS \\ KG.GS \end{array}\right\} < KF.FS$ (El. VI. 1.)

also $KM.MS \gtrless \left\{\begin{array}{l} KG.GS \\ KE.FS \end{array}\right.$ (siehe Schol. in El. lib. II. ed. Pfleiderer Tub. 1797. §. 38. und Conv.)

folglich $MK : KE \gtrless FS : SM$ (Hauber §. 52.)

somit $MK : \begin{cases} MK - KE \\ ME \end{cases} \gtrless FS : \begin{cases} FS - SM \\ FM \end{cases}$ (Hauber §. 24.)

$OK : LE$

demnach $\begin{matrix} OK : FS \\ HE : FG \end{matrix} \gtrless LE : FM$

Die dem Punkte E näher liegenden Punkte der Linie FS bestimmen also gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, welches die CD in G' schneide, so ist

$SG'.G'K = TS.KU$

$= FS.EK$

Nun ist $FS < SE$

also $\begin{matrix} FS.EK \\ SG'.G'K \\ S\alpha^2 - \alpha G^2 \end{matrix} \Big\} < \begin{cases} SE.EK \\ S\alpha^2 - \alpha E^2 \end{cases}$

somit $G'\alpha^2 > \alpha E^2$

folglich $G'\alpha > \alpha E$

mithin $G'K < KE$

demnach liegt der Punkt G' zwischen K, E.

Ferner ist $FS : SG' = G'K : KE$

folglich $FS : \begin{cases} G'S - SF \\ FG' \end{cases} = \begin{cases} G'K : \begin{cases} EK - KG' \\ EG' \end{cases} \\ OK : H'E \end{cases}$

also $\begin{matrix} OK \\ FN \\ p : q \end{matrix} \Big\} : SF \Big\} = H'E : FG'$

Es ist mithin eine zweite Linie OH' gefunden, welche von den Linien DE, EB Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 3. ist.

Fall 2.

Die gesuchten Segmente sollen liegen auf den Linien AE, EF. (Fig. 13.)

Analysis.

Es sey HG die gesuchte Linie, so ist KG. GS der Gröfse nach gegeben, wie Anal. zu Fall 1. Da auch KG−GS=KS gegeben ist, so ist KG (Dat. 85.), somit G (Dat. 30.) und die Lage der geraden Linie OG gegeben (Dat. 30.).

Construction.

Man mache FN ∥ OK ∥ AB, KN ∥ OF, FP=p, FQ=q, u. s. f., wie Constr. zu Fall 1.

Beweis.

Es ist FK>KE

also KF. FS > FS. KE (El. VI. 1.)

wenn $K\alpha=\alpha S$, $F\alpha^2-\alpha S^2$ > KG. GS (Lehnsatz B.)

$G\alpha^2-\alpha S^2$

folglich $F\alpha^2>G\alpha^2$

mithin $F\alpha>\alpha G$

somit FS>SG

Ferner ist GK : KE = FS : SG (El. VI. 16.)

also GK>KE

mithin liegt der Punkt G zwischen F, E.

Auch ist $KG : GE = SF : FG$ (El. V. 17.)

somit $p : q = HE : FG$, wie Fall 1. Bew.

Zus. 1. (Apoll.)

Für eine andere die Linien FE, EA in M, L schneidende gerade Linie OM ist

$$EL \gtrless EH, MF \lessgtr FG$$

also $EL : FM \gtrless \left\{ \begin{matrix} EH : FG \\ p : q \end{matrix} \right.$ (Hauber §. 41.)

Die dem Punkte E näher liegenden Punkte der Linie EF bestimmen also kleinere Verhältnisse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, welches die Linie CD in G' schneide, so ist

$$KG' . G'S = FS . EK$$

also $G'K : KE = FS : G'S$

folglich $\left. \begin{matrix} G'K : G'E \\ OK : H'E \end{matrix} \right\} = FS : FG'$ (El. V. 18.)

wenn G'O die AB in H' schneidet,

mithin $\left. \begin{matrix} OK : FS \\ p : q \end{matrix} \right\} = H'E : FG'$

Demnach sind auch auf den Linien EA, FD zwey Segmente mit der gegebenen Eigenschaft gefunden worden, welches Fall 4. ist.

Fall 3.

Die gesuchten Segmente sollen liegen auf den Linien EB, FK. (Fig. 12.)

Analysis.

Es sey H'G' die gesuchte Linie. Zieht man OK#AB, und macht OK : FS = p : q

= H'E : FG'

so ist $\left.\begin{matrix} OK : H'E \\ KG' : G'E \end{matrix}\right\} = FS : FG'$

also $KG' : KE = FS : G'S$

folglich $KG' . G'S = EK . FS$

Da KE, FS gegeben sind; so ist KG'. G'S, und da KG'+G'S=KS gegeben ist, so ist KG' (Dat. 86.), somit G' und die Lage der geraden Linie OG' gegeben.

Construction.

Buchst., wie zu Fall 1., wenn man G', H', R' statt G, H, R setzt.

Beweis.

Es ist $FS < SE$

also $FS . EK < SE . EK$

folglich $FS . EK < \frac{1}{4} SK^2$

mithin schneidet der Halbkreis die Linie TU (Lehns. A.).

Nun ist $\left.\begin{matrix} SG' . G'K \\ S\alpha^2 - \alpha G^2 \end{matrix}\right\} < \left\{\begin{matrix} SE . EK \text{ (Lehns. A.)} \\ S\alpha^2 - \alpha E^2, \text{ wenn } K\alpha = \alpha S, \end{matrix}\right.$

folglich $G'\alpha^2 > E\alpha^2$

mithin $G'\alpha > E\alpha$

demnach liegt G' zwischen E, K.

Ferner ist EK : KG' = G'S : SF (El. VI. 16.)

folglich $\left.\begin{matrix} KG' : G'E \\ OK : H'E \end{matrix}\right\} = SF : FG'$ (El. V. 17.)

$$\text{mithin } \left.\begin{matrix} OK \\ FN \end{matrix}\right\} : SF \Big\} = H'E : FG'$$
$$PF : FQ$$
$$p : q$$

Zus. 1. (Apoll.)

Für eine andere die Linien EK, EB in M', L' schneidende gerade Linie OM' ist

$$KM' . M'S \gtrless \begin{cases} KG' . G'S \\ KE . FS \end{cases}$$ (Pfleiderers Schol. in El. II. §. 38. u. Conv.)

also $M'K : KE \gtrless FS : SM'$ (Hauber §. 53.)

folglich $\left.\begin{matrix} M'K : EM' \\ OK : L'E \end{matrix}\right\} \gtrless FS : M'F$ (Hauber §. 28.)

mithin $\left.\begin{matrix} OK : FS \\ p : q \end{matrix}\right\} \gtrless L'E : M'F$

Demnach bestimmen die dem Punkte E näher liegenden Punkte der Linie EK kleinere Verhältnisse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, welches CD in G schneide, so ist $SG . GK < SE . EK$

also $p : q = HE : FG$,

wie Fall 1. Bew. Es ist also eine zweite Linie gefunden worden, welche auf den Linien FC, EA Segmente in dem gegebenen Verhältnisse abschneidet, welches Fall 1. ist.

Fall 4.

Die gesuchten Segmente sollen liegen auf den Linien E A, F D. (Fig. 13.)

Analysis.

Es sey H'G' die gesuchte Linie, so ist KG'. G'S gegeben, wie Fall 3. Anal. Da nun auch G'S – KG' = KS gegeben ist, so ist KG' (Dat. 85.), somit G' und die Lage der geraden Linie OG' gegeben.

Construction.

Buchst., wie zu Fall 2., wenn man G', H', R' statt G, H, R setzt.

Beweis.

Es ist KG'. G'S = FS. KE (Lehns. B.)

also G'K : KE = FS : SG'

folglich p : q = H'E : FG', wie Fall 3. Bew.

Zus. 1. (Apoll.)

Für eine andere die Linien KD, EA in M', L' schneidende gerade Linie OM' ist

$$\left.\begin{matrix} SG'.G'K \\ FS.KE \end{matrix}\right\} \gtrless SM'.M'K \quad \text{(El. II. 6.)}$$

also $EK : KM' \gtrless M'S : SF$ (Hauber §. 53.)

folglich $\left.\begin{matrix} EM' : M'K \\ EL' : KO \end{matrix}\right\} \gtrless M'F : FS$ (Hauber §. 19.)

mithin $EL' : M'F \gtrless \left\{\begin{matrix} KO : FS \\ EH' : FG' \end{matrix}\right.$ (Hauber §. 43.)

Die dem Punkte E näher liegenden Punkte der Linie KD bestimmen also kleinere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, welches CD in G schneide, so ist FK>KE, also liegt G zwischen F, E, und es ist p : q = HE : FG, wie Fall 2. Bew.; folglich sind auch auf den Linien EF, EA Segmente in dem gegebenen Verhältnifse gefunden worden, welches Fall 2. ist.

Anm. zu loc. IV.

Da bey keinem Falle von loc. IV. eine Determination statt findet, so kann die Aufgabe für jedes gegebene Verhältnifs nach jedem Falle aufgelöfst werden.

B.) auf der Linie ED. (Fig. 14—26.)

Es liege, wenn K den Durchschnitt der mit AB parallel gezogenen Linie OK und der Linie CD bezeichnet, der Punkt F

a.) in K. (Fig. 14—16.) (Loc. V.)

Fall 1.

Die gesuchten Segmente sollen liegen auf den Linien EA, KD. (Fig. 14.)

Analysis.

Es sey HG die gesuchte Linie. Macht man OK ∥ AB, und OK : KS = p : q
= EH : KG

so ist $\left.\begin{matrix} OK : HE \\ KG : GE \end{matrix}\right\} = SK : KG$

also $KG : \left\{\begin{matrix} EG-GK \\ EK \end{matrix}\right\} = SK : \left\{\begin{matrix} GK-KS \\ GS \end{matrix}\right.$

folglich $KG.GS = EK.KS$

Da EK, KS gegeben sind, so ist KG. GS der Gröfse nach, und, da KG—GS=KS gegeben ist, KG (Dat. 85.), somit G, und die gerade Linie OG der Lage nach gegeben.

Construction.

Man mache OK#AB, KP=p, KQ=q, OS#PQ, EKU=KST=R, UK=KE, TS=SK, beschreibe über KS als Durchmesser einen Kreis, welcher von der geraden Linie TU in R geschnitten werde, und errichte in R auf TU die gerade Linie RG perpendicular, welche der Linie CD in R begegne, so ist OG die gesuchte Linie.

Beweis.

Es ist $KG.GS = UK.ST$ (Lehns. B.)
$= EK.KS$

also $GK : KE = KS : SG$

folglich $KG : \left\{\begin{matrix} GK+KE \\ GE \\ OK : HE \end{matrix}\right\} = KS : \left\{\begin{matrix} KS+SG \\ KG \end{matrix}\right\}$

mithin $\left.\begin{matrix} OK : KS \\ PK : KQ \\ p : q \end{matrix}\right\} = HE : KG$

Zus. 1. (Apoll.)

Für eine andere, die Linien EA, KD in L, M schneidende gerade Linie OM ist

$$EI \lessgtr EH, KM \gtrless KG$$

also $EI : KM \lessgtr EH : KG$ (Hauber §. 41.)

folglich bestimmen die dem Punkte E näher liegenden Punkte der Linie KD gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' der Linie TU und des Kreises ein die AB in G' schneidendes Perpendikel auf TU, so ist

$$KG' . G'S = EK . KS$$

also $G'K : KE = KS : SG'$

Da $KS < SG'$

so ist $G'K < KE$

folglich liegt G' zwischen K, E.

Ferner ist $G'K : \left\{ \begin{matrix} EK - G'K \\ EG' \\ OK : EH' \end{matrix} \right\} = KS : \left\{ \begin{matrix} SG' - KS \\ KG' \end{matrix} \right.$

also $OK : KS \left\{ \begin{matrix} \\ p : q \end{matrix} \right. = EH' : KG'$

mithin ist auch eine Linie OG' gefunden, welche von den Linien EB, EK Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 2. ist.

Fall 2.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien BE, EK. (Fig. 14.)

Analysis.

Es sey H'G' die gesuchte Linie. Macht man OK # AB, und OK : KS = p : q
= EH' : KG'

so ist $\left.\begin{matrix} OK : H'E \\ KG' : G'E \end{matrix}\right\} = SK : KG'$

also $KG' : \left\{\begin{matrix} KG'+G'E \\ KE \end{matrix}\right\} = SK : \left\{\begin{matrix} SK+KG' \\ SG' \end{matrix}\right.$

folglich KG'. G'S = SK. KE

Da SK, KE gegeben sind, so ist KG'. G'S der Gröfse nach, und, da G'S — KG' = KS gegeben ist, KG' (Dat. 85.), somit G' und die gerade Linie OG' der Lage nach gegeben.

Construction.

Buchst., wie zu Fall 1., wenn nur R', G', H' statt R, G, H gesetzt wird.

Beweis.

Es ist KG'. G'S = EK. KS

also p : q = EH' : KG', wie Fall 1. Zus. 2.

Zus. 1. (Apoll.)

Für eine andere die Linien EB, EK in M, L schneidende gerade Linie ist $EL' \gtrless EH', KM' \gtrless KG'$

folglich $EL' : KM' \gtrless EH' : KG'$

mithin bestimmen die dem Punkte E näher liegenden Punkte der Linie KE kleinere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte K der Linie TU und des Kreises ein die Linie KD in G schneidendes Perpendikel auf TU, so ist

$$KG.GS = EK.KS$$

folglich $p : q = EH : KG$ (buchst., wie Bew. zu Fall 1.), also ist auch eine Linie OG gefunden, welche von den Linien EA, KD Segmente abschneidet in dem gegebenen Verhältnifse, welches Fall 1. ist.

Fall 3.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien EA, KC. (Fig. 15. 16.)

Analysis.

Es sey HG die gesuchte Linie. Macht man OK $\#$AB, und $OK : KS = p : q$

$$= EH : KG$$

so ist $\left.\begin{matrix} OK : EH \\ KG : GE \end{matrix}\right\} = SK : KG$

also $KG : \left\{\begin{matrix} KG-GE \\ KE \end{matrix}\right\} = SK : \left\{\begin{matrix} SK-KG \\ GS \end{matrix}\right.$

folglich $KG.GS = EK.KS$

Da EK, KS gegeben sind, so ist KG.GS der Gröfse nach, und, da $KG + GS = KS$ gegeben ist, KG (Dat. 86.), somit G und die gerade Linie OG der Lage nach gegeben.

Construction.

Buchst., wie zu Fall 1.

Determination.

Damit der über KS beschriebene Halbkreis der Linie TU begegne, mufs (verm. Lehns. A. Det.) seyn

$$\left.\begin{matrix} TS.KU \\ SK.KE \end{matrix}\right\} \leqq \tfrac{1}{4}SK^2$$

$$\text{also } KE \leqq \tfrac{1}{4}SK$$

$$\text{folglich } 4KE \leqq SK$$

$$\text{mithin } OK : 4KE \left\{\begin{matrix} \geqq \\ < \end{matrix}\right\} \begin{matrix} OK : KS \\ p : q \end{matrix} \quad \text{(El. V. 8.)}$$

Beweis.

$$\text{Es ist } OK : 4KE \left\{\begin{matrix} > \\ \leqq \end{matrix}\right\} \begin{matrix} p : q \\ OK : KS \end{matrix}$$

$$\text{also } 4KE \leqq KS$$

$$\text{folglich } KE \leqq \tfrac{1}{4}KS$$

$$\text{mithin } \left.\begin{matrix} SK.KE \\ TS.KU \end{matrix}\right\} \leqq \tfrac{1}{4}KS^2$$

also berührt (Fig. 15.), oder schneidet (Fig. 16.) der Kreis die Linie TU (Lehns. A.), so dafs $SG.GK = SK.KE$

$$\text{also } GK : KE = KS : SG$$

$$\text{Da } KS > SG$$

$$\text{so ist } GK > KE$$

also liegt der Punkt G auf der Linie EC.

$$\text{Ferner ist } GK : \left\{\begin{matrix} GK - K \\ GE \\ OK : HE \end{matrix}\right\} = KS : \left\{\begin{matrix} KS - SG \\ KG \end{matrix}\right.$$

$$\text{also } \left.\begin{matrix} OK : KS \\ p : q \end{matrix}\right\} = HE : KG$$

Zus. 1. (Apoll.)

Für eine andere die Linien EA, KS (Fig. 15.) in L, M schneidende gerade Linie OM ist

$$\left.\begin{matrix} KG.GS \\ SK\ KE \end{matrix}\right\} > KM.MS, \text{ weil } KG = GS,$$

$$\text{also } MK : KE < KS : SM \text{ (Hauber §. 53.)}$$

$$\text{folglich } MK : \left.\begin{matrix} \left\{\begin{matrix} MK-KE \\ ME \end{matrix}\right\} \\ OK : EL \end{matrix}\right\} > KS : \left\{\begin{matrix} KS-SM \\ KM \end{matrix}\right. \text{ (Hauber §. 24.)}$$

$$\text{mithin } \left.\begin{matrix} OK : KS \\ EH : KG \end{matrix}\right\} > EL : KM \text{ (Hauber §. 43.)}$$

Dieser Punkt G, für welchen GE = EK, bestimmt also ein gröſseres Verhältniſs, als jeder andere Punkt der Linie ES.

$$\text{Macht man } EL : KM = OK : KV$$

$$\text{so ist } OK : KV < OK : KS$$

$$\text{also } KV > KS$$

$$\text{Auch ist } \left.\begin{matrix} EL : OK \\ EM : MK \end{matrix}\right\} = MK : KV$$

$$\text{folglich } \left.\begin{matrix} KM-ME \\ EK \end{matrix}\right\} : MK = \left\{\begin{matrix} VK-KM \\ MV \end{matrix}\right\} : KV$$

$$\text{mithin } KM.MV = EK.KV$$

$$\text{Ferner ist } GK > KE$$

$$\text{also } GK.VS > KE.VS$$

$$\text{folglich } \left.\begin{matrix} KG.GS + KG.SV \\ KG.GV \end{matrix}\right\} > \left\{\begin{matrix} SK.KE + KE.VS \\ VK.KE \\ KM.MV \end{matrix}\right.$$

mithin liegt G dem Halbirungspunkte von KV näher, als M (El. II. 5.). Ist nun YG>GM, so ist also auch $\left.\begin{matrix} KM.MV \\ VK.KE \end{matrix}\right\} > KY.YV$

somit $YK : KE < KV : VY$ (Hauber §. 53.)

also $YK : \left\{\begin{matrix} YK-KE \\ YE \end{matrix}\right\} > KV : \left\{\begin{matrix} KV-VY \\ KY \end{matrix}\right.$ (Hauber §. 24.)

$OK : XE$ wenn OY die AB in X schneidet,

folglich $\left.\begin{matrix} OK : KV \\ EL : KM \end{matrix}\right\} > EX : KY$

mithin bestimmen die dem Punkte G näher liegenden Punkte der Linie ES gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2. (Apoll.)

Errichtet man (Fig. 16.) in dem zweiten Durchschnitte R' des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, welches die CD in G' schneide, so ist $SG'.GK = SK.KE$

also $G'K : KE = KS : SG'$

Da $KS > SG'$

so ist $G'K > KE$

folglich liegt auch der Punkt G' auf der Linie EC.

Ferner ist $G'K : \left\{\begin{matrix} G'K-KE \\ EG' \end{matrix}\right\} = KS : \left\{\begin{matrix} KS-SG' \\ KG' \end{matrix}\right.$

$OK : EH'$

also $\left.\begin{matrix} OK : KS \\ p : q \end{matrix}\right\} = EH' : KG'$

Es ist mithin eine zweite Linie OG' gefunden, welche auf den Linien EA, KC Segmente in dem gegebenen Verhältnisse abschneidet.

Anm. zu loc. V.

Die in loc. V. enthaltene Aufgabe kann, je nachdem $p : q \begin{Bmatrix} = \\ > \\ < \end{Bmatrix} OK : 4KE$, nach Fall $\begin{Bmatrix} 1.2.3. \\ 1.2. \\ 1.2.3. \end{Bmatrix}$ aufgelöst werden.

b.) zwischen E, K. (Fig. 17—21.). (Loc. VI.)

Fall 1.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien EA, FD. (Fig. 17.)

Analysis.

Buchst., wie loc. IV. Fall 2. Anal.

Construction.

Buchst., wie zu loc. IV. Fall 1.

Beweis.

Es ist KG.GS=FS.EK (Lehns. B.)

also GK : KE=FS : SG

folglich p : q=EH : FG, wie loc. IV. Fall 1. Bew.

Zus. 1. (Apoll.)

Für eine andere die geraden Linien AE, FD in L, M schneidende gerade Linie OM ist

$EL \lessgtr EH, FM \gtrless FG$

also $EL : FM \lessgtr EH : FG$ (Hauber §. 41.)

mithin bestimmen die dem Punkte E näher liegenden Punkte der Linie KD gröfsere Verhältnisse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' des Kreises und der Linie TU auf TU ein Perpendikel R'G', welches die Linie CD in G' schneide, so ist $KG' \cdot G'S = FS \cdot EK$

also $KG' \cdot G'S \left\{ \begin{matrix} > \\ G'\alpha^2 - \alpha S^2 \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} KF \cdot FS \\ F\alpha^2 - \alpha S^2 \end{matrix} \right.$, $KG' \cdot G'S \left\{ \begin{matrix} < \\ G'\alpha^2 - \alpha S^2 \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} SE \cdot EK \\ E\alpha^2 - \alpha S^2 \\ \text{w. } K\alpha = \alpha S, \end{matrix} \right.$

folglich $G'\alpha > \alpha F$, $G\alpha < \alpha E$

mithin liegt G' zwischen E, F.

Ferner ist $EK : KG' = G'S : SF$

also $p : q = EH' : FG'$ (buchst., wie loc. IV. Fall 3. Bew.), mithin ist eine Linie OG' gefunden, welche von den Linien FE, EB Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 3. ist.

Fall 2.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FD, EB. (Fig. 18. 19.)

Analysis.

Buchst., wie zu loc. IV. Fall 1.

Construction.

Buchst., wie zu loc. IV. Fall 1.

Determination.

Damit der Kreis der geraden Linie TU begegne, mufs seyn $UK \cdot ST \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} \frac{1}{4} KS^2 \text{ (Lehns. A. Det.)} \\ \frac{1}{4}(KF+FS)^2 \end{matrix} \right.$
$EK \cdot FS$

also $4EK \cdot FS \underset{<}{=} KF^2 + 2KF \cdot FS + FS^2$ (El. II. 4.)

folglich $2(2EK - KF)FS - KF^2 \underset{<}{=} FS^2$

mithin $(KE+EF)^2-(KE-EF)^2 \left\{\begin{matrix}=\\<\end{matrix}\right\} (KE+EF)^2-2(KE+EF)FS+FS^2$
(El. II. 4. 7.) $4KE.EF$

somit $2\sqrt{KE.EF} \leqq KE+EF-FS$

demnach $FS \left\{\begin{matrix}=\\<\end{matrix}\right\} KE+EF-2\sqrt{KE.EF}$

also $OK : FS \left\{\begin{matrix}=\\>\end{matrix}\right\} OK : KE+EF-2\sqrt{KE.EF}$ (El. V. 8.);
$p : q$

Beweis.

Es ist $p : q \left\{\begin{matrix}=\\>\end{matrix}\right\} OK : KE+EF-2\sqrt{KE.EF}$ (Det.)
$OK : FS$

also $FS \left\{\begin{matrix}=\\<\end{matrix}\right\} KE+EF-2\sqrt{KE.EF}$ (El. V. 10.)

folglich $2\sqrt{KE.EF} \left\{\begin{matrix}=\\<\end{matrix}\right\} KE+EF-FS$

mithin $4KE.EF \left\{\begin{matrix}=\\<\end{matrix}\right\} (KE+EF)^2-\left\{\begin{matrix}2(KE+EF)\\2(2EK-KF)\end{matrix}\right\}FS+FS^2$
$(KE+EF)^2-\left\{\begin{matrix}(KE-EF)^2\\KF^2\end{matrix}\right\}$

somit $2(2EK-KF)FS \left\{\begin{matrix}=\\<\end{matrix}\right\} KF^2+FS^2$

demnach $4EK.FS \left\{\begin{matrix}=\\<\end{matrix}\right\} KF^2+2KF.FS+FS^2$

also $EK.FS \left\{\begin{matrix}=\\<\end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix}\frac{1}{4}(KF+FS)^2\\\frac{1}{4}KS^2\end{matrix}\right.$
$UK.ST$

olglich berührt (Fig. 18.), oder schneidet (Fig. 19.) der Kreis die
;erade Linie TU, so dafs $KG.GS=EK.FS$

also $GK : KE=FS : SG$

Nun ist $FK<KE$

also $KF.FS < EK.FS$ (El. VI. 1.)

folglich $KF(KF+FS) \left\{ \begin{matrix} \\ FK.KS \end{matrix} \right\} < KF^2 + \left\{ \begin{matrix} EK.FS \\ KG\ GS \\ \frac{1}{4}KS^2 - G\alpha^2, \text{ wenn} \\ K\alpha = \alpha S, \end{matrix} \right.$

mithin $G\alpha^2 < (KF - \frac{1}{2}KS)^2$

somit $G\alpha < KF - \frac{1}{2}KS$

demnach $\frac{1}{2}KS + G\alpha \left\{ \begin{matrix} \\ KG \end{matrix} \right\} < KF$

also liegt G zwischen K, F.

Ferner ist $KG : \left\{ \begin{matrix} EK-KG \\ GE \\ OK : HE \end{matrix} \right\} = FS : \left\{ \begin{matrix} GS-SF \\ FG \end{matrix} \right.$

also $\left\{ \begin{matrix} OK \\ NF \\ p \end{matrix} \right\} : FS \left\{ \begin{matrix} \\ \\ : q \end{matrix} \right\} = EH : FG$

Zus. 1. (Apoll.)

Für eine andere, die Linien KF, EB (Fig. 18.) in M, L schneidende gerade Linie OM ist

$KG.GS \left\{ \begin{matrix} \\ SF.KE \end{matrix} \right\} > KM.MS$, weil $KG = GS$,

also $MK : KE < FS : SM$ (Hauber §. 53.)

folglich $MK : \left\{ \begin{matrix} EK-KM \\ ME \\ OK : EL \end{matrix} \right\} < FS : \left\{ \begin{matrix} MS-SF \text{ (Hauber §. 28.)} \\ MF \end{matrix} \right.$

mithin $\left\{ \begin{matrix} OK : FS \\ EH : FG \end{matrix} \right\} < EL : MF$ (Hauber §. 43.)

Der Punkt G, für welchen $GE = \sqrt{KE.EF}$, bestimmt also ein kleineres Verhältnifs, als jeder andere Punkt der Linie K F.

Macht man $EL : FM = OK : FV$

so ist $OK : FV > OK : FS$

also $FV < FS$ (El. V. 10.)

Auch ist $\left.\begin{matrix} EL : OK \\ EM : MK \end{matrix}\right\} = MF : FV$

folglich $\left.\begin{matrix} EM+MK \\ EK \end{matrix}\right\} : MK = \left\{\begin{matrix} MF+FV \\ MV \end{matrix}\right\} : FV$

mithin $KM.MV = EK.FV$

Ferner ist $GK < KE$

also $GK.VS < KE.VS$ (El. VI. 1.)

folglich $\left.\begin{matrix} KG\,(GS-SV) \\ KG.GV \end{matrix}\right\} > \left\{\begin{matrix} (FS-SV)\,KE \\ FV.KE \\ KM.MV \end{matrix}\right.$

also liegt G dem Halbirungspunkte von K V näher, als M. (El. II. 5.). Ist nun $YG > GM$, so ist

$\left.\begin{matrix} KM.MV \\ EK.FV \end{matrix}\right\} > KY.YV$

also $YK : KE < FV : VY$ (Hauber §. 53.)

folglich $YK : \left\{\begin{matrix} EK-KY \\ YE \end{matrix}\right\} < FV : \left\{\begin{matrix} YV-VF \text{ (Hauber §. 28.)} \\ YF \end{matrix}\right.$

$OK : EX$ wenn OY der EB in X begegnet,

also $\left.\begin{matrix} OK : FV \\ EL : FM \end{matrix}\right\} < EX : FY$

mithin bestimmen die dem Punkte G näher liegenden Punkte kleinere Verhältnisse, als die entfernteren.

Zus. 2. (Apoll.)

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' (Fig. 19.) des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, welches der KF in G' begegne, so ist

$$SG'.G'K = FS.EK$$

also $G'K : KE = FS : SG'$

folglich $p : q = H'E : G'F$, wie loc. IV. Fall 1. Zus. 2., mithin ist eine zweite Linie OG' gefunden, welche von den Linien EB, FG Segmente in dem gegebenen Verhältnisse abschneidet.

Fall 3.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FE, EB. (Fig. 17.)

Analysis.

Es sey H'G' die gesuchte Linie. Macht man OK $\#$ AB, und $OK : FS = p : q$, so ist, wie loc. IV. Fall 3. Anal., KG'.G'S der Gröfse nach, und da SG' — G'K = SK gegeben ist, KG' (Dat. 85.), somit G' und die Linie OG' der Lage nach gegeben.

Construction.

Buchst., wie zu loc. IV. Fall 1., wenn man R', G', H' statt R, G, H setzt.

Beweis.

Es ist $KG'.G'S = FS.EK$

also $p : q = EH' : FG'$ (Buchst., wie Fall 1. Zus. 2.)

Zus. 1. (Apoll.)

Für eine andere die Linien FE, EB in M', L' schneidende gerade Linie ist

$$EL' \lessgtr EH',\ FM' \gtrless FG'$$

also $EL' : FM' \lessgtr EH' : FG'$ (Hauber §. 41.)

folglich bestimmen die dem Punkte E näher liegenden Punkte der Linie EF kleinere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R des Kreises und der geraden Linie TU ein Perpendikel auf TU, welches die Linie FD in G schneide, so ist $KG.GS = FS.KE$

also $EH : FG = p : q$ (buchst., wie zu Fall 1. Bew.)

Es ist also auch eine Linie OG gefunden, welche von den Linien EA, FD Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 1. ist.

Fall 4.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien EA, FC. (Fig. 20. 21.)

Analysis. Construction.

Buchst., wie zu loc. IV. Fall 1.

Determination.

Damit der Kreis der geraden Linie TU begegne, mufs seyn

$$\left.\begin{matrix} UK.ST \\ EK.FS \end{matrix}\right\} \lessgtr \left\{\begin{matrix} \frac{1}{4}SK^2 \\ \frac{1}{4}(KF+FS)^2 \end{matrix}\right.$$

also $4EK.FS \lessgtr KF^2+2KF.FS+FS^2$

folglich $2(2EK-KF)FS-KF^2 \overset{=}{<} FS^2$

mithin $\left.\begin{matrix}(KE+EF)^2\ (KE-EF)^2\\ 4KE.\,EF\end{matrix}\right\} \overset{=}{<} FS^2-2(KE+EF)FS+(KE+EF)$

somit $2\sqrt{KE.\,EF} \overset{=}{<} FS-(KE+EF)$

demnach $KE+EF+2\sqrt{KE.EF} \overset{=}{<} FS$

also $\left.\begin{matrix}OK : FS\\ p : q\end{matrix}\right\} \overset{=}{<} OK : KE+EF+2\sqrt{KE.EF}$

Beweis.

Es ist $\left.\begin{matrix}p : q\\ OK : FS\end{matrix}\right\} \overset{=}{<} OK : KE+EF+2\sqrt{KE.\,EF}$

also $FS \overset{=}{>} KE+EF+2\sqrt{KE.\,EF}$

folglich $FS-(KE+EF) \overset{=}{>} 2\sqrt{KE.\,EF}$

mithin

$FS^2-2(KE+EF)FS+(KE+EF)^2 \overset{=}{>} \left\{\begin{matrix}4KE.\,EF\\ (KE+EF)^2-(KE-EF)^2\end{matrix}\right.$

somit $FS^2 \overset{=}{>} 2(2KE-KF)FS-KF^2$

demnach $KF^2+2KF.FS+FS^2 \overset{=}{>} 4KE.FS$

also $\left.\begin{matrix}\frac{1}{4}(KF+FS)^2\\ \frac{1}{4}KS^2\end{matrix}\right\} \overset{=}{>} \left\{\begin{matrix}KE.\,FS\\ UK.\,TS\end{matrix}\right.$

folglich berührt (Fig. 20.), oder schneidet (Fig. 21.) der Kreis die Linie TU, so daſs $KG.\,GS=KE.FS$

also $GK : KE=FS : SG$

Nun ist $FK<KE$

also $KF.FS < FS.KE$

folglich $\left.\begin{matrix} KF(KF+FS) \\ FK.KS \end{matrix}\right\} < KF^2 + \left\{\begin{matrix} KG.GS \\ \frac{1}{4}KS^2 - G\alpha^2, \text{ wenn} \\ K\alpha = \alpha S, \end{matrix}\right.$

mithin $G\alpha^2 < (\frac{1}{2}KS - KF)^2$

somit $KF < \left\{\begin{matrix} \frac{1}{2}KS - G\alpha \\ KG \end{matrix}\right.$

demnach $FS > SG$

also $GK > KE$

folglich liegt G auf der Linie EC.

Auch ist $GK : \left\{\begin{matrix} GK - KE \\ EG \end{matrix}\right\} = FS : \left\{\begin{matrix} FS - SG \\ FG \end{matrix}\right.$

$OK : HE$

mithin $\left.\begin{matrix} OK \\ NF \\ p : q \end{matrix}\right\} : FS = HE : FG$

Zus. 1. (Apoll.)

Für eine andere, die Linien EA, FS (Fig. 20.) in L, M schneidende gerade Linie OM ist

$\left.\begin{matrix} KG.GS \\ SF\,KE \end{matrix}\right\} > KM.MS$

also $MK : KE < FS : SM$

folglich $MK : \left\{\begin{matrix} MK - KE \\ ME \end{matrix}\right\} > FS : \left\{\begin{matrix} FS - SM \\ FM \end{matrix}\right.$ (Hauber §. 24.)

$OK : EL$

mithin $\left.\begin{matrix} OK : FS \\ EH : FG \end{matrix}\right\} > EL : FM$

demnach bestimmt der Punkt G, für welchen $GE = \sqrt{FE.EK}$, ein gröfseres Verhältnifs, als jeder andere Punkt der Linie ES.

Macht man $EL : FM = OK : FV$

so ist $OK : FV < OK : FS$

also $FV > FS$

Auch ist $\left.\begin{matrix} EL : OK \\ EM : MK \end{matrix}\right\} = FM : FV$

folglich $\left.\begin{matrix} KM-ME \\ EK \end{matrix}\right\} : MK = \left\{\begin{matrix} VF-FM \\ MV \end{matrix}\right\} : FV$

mithin $KM.MV = EK.FV$

Ferner ist $GK > KE$

also $GK.VS > KE.VS$

folglich $\left.\begin{matrix} GK(GS+SV) \\ KG.GV \end{matrix}\right\} > \left\{\begin{matrix} EK(FS+SV) \\ EK.FV \\ KM.MV \end{matrix}\right.$

also liegt G dem Halbirungspunkte von KV näher, als M. Ist nun $YG > GM$

so ist $\left.\begin{matrix} KM.MV \\ EK.FV \end{matrix}\right\} > KY.YV$ (El. II. 5.)

also $YK : KE < FV : VY$

folglich $YK : \left\{\begin{matrix} YK\ KE \\ YE \end{matrix}\right\} > FV : \left\{\begin{matrix} FV-VY \\ FY \end{matrix}\right\}$ (Hauber §. 24.)

$OK : EX$ wenn OY die AB in X schneidet,

mithin $\left.\begin{matrix} OK : FV \\ EL : FM \end{matrix}\right\} > EX : FY$

Demnach bestimmen die dem Punkte G näher liegenden Punkte gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2. (Apoll.)

Errichtet man (Fig. 21.) in dem zweiten Durchschnitte R′ des Kreises mit der Linie TU ein Perpendikel auf TU, welches der Linie KS in G′ begegne, so liegt auch G′ auf EC, und wenn OG′ der AE in H′ begegnet, so ist p : q=H′E : FG′, welches eben so bewiesen wird, wie es für EH, FG geschehen ist.

Anm. zu loc. VI.

Wenn das gegebene Verhältnifs

$$p : q \begin{cases} = \\ > \\ \end{cases} OK : KE+EF-2\sqrt{KE.EF} \Big\} \begin{cases} = \\ < \\ \end{cases} OK : KE+EF+2\sqrt{KE.EF}$$

, so kann die Aufgabe nach Fall $\begin{cases} 1.\ 2.\ 3. \\ 1.\ 3\ 4. \end{cases}$ aufgelöfst werden.

c.) auf der Verlängerung von EK. (Fig. 22 – 26.). (Loc. VII.)

Fall 1.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien EA, FD. (Fig. 22.)

Analysis.

Buchst., wie zu loc. IV. Fall 2.

Construction.

Buchst., wie zu loc. IV. Fall 1.

Beweis.

Es ist KG.GS=EK.FS

also $GK : KE = FS : SG$

folglich $p : q = EH : FG$ (wie loc. IV. Fall 1. Bew.)

Zus. 1. (Apoll.)

Buchst., wie zu loc. VI. Fall 1. Zus. 1.

Zus. 2.

Errichtet man auch in dem zweiten Durchschnitte R' der Linie TU und des Kreises ein Perpendikel auf TU, so ist $KG' . G'S = FS . KE$

also $G'K : KE = FS : SG'$

Da $FS < SG'$ (Lehns. B.)

so ist $G'K < KE$

also liegt der Punkt G' zwischen K, E.

Ferner ist $G'K : \left\{\begin{matrix} EK - KG' \\ EG' \end{matrix}\right\} = FS : \left\{\begin{matrix} G'S - SF \\ G'F \end{matrix}\right\}$

$OK : EH'$

wenn die gerade Linie OG' die Linie EB in H' schneidet,

folglich $OK : FS \left\{\begin{matrix} \\ p : q \end{matrix}\right\} = EH' : FG'$

Es ist mithin eine Linie OG' gefunden, welche von den Linien FE, EB Segmente in dem gegebenen Verhältnisse abschneidet, welches Fall 3. ist.

Fall 2.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien EA, FK; (Fig. 23. 24.)

Analysis. Construction.

Buchst., wie zu loc. IV. Fall 1.

Determination.

Damit der Kreis der geraden Linie TU begegne, muſs seyn $\left.\begin{matrix} UK.ST \\ EK.FS \end{matrix}\right\} \leqq \left\{\begin{matrix} \frac{1}{4}SK^2 \\ \frac{1}{4}(KF-FS)^2 \end{matrix}\right.$

also $4EK.FS \leqq KF^2-2KF.FS+FS^2$

folglich $\left.\begin{matrix} 2(2EK+KF)FS \\ 2(FE+EK)FS \end{matrix}\right\} -KF^2 \leqq FS^2$

mithin $\left.\begin{matrix} (FE+EK)^2-(FE-EK)^2 \\ 4FE.EK \end{matrix}\right\} \leqq (FE+EK)^2-2(FE+EK)FS+FS^2$

somit $2\sqrt{FE.EK} \leqq (FE+EK)-FS$

demnach $FS \leqq FE+EK-2\sqrt{FE.EK}$

also $\left.\begin{matrix} OK : FS \\ p : q \end{matrix}\right\} \geqq OK : FE+EK-2\sqrt{FE.EK}$

Beweis.

Es ist $\left.\begin{matrix} p : q \\ OK : FS \end{matrix}\right\} \geqq OK : FE+EK-2\sqrt{FE.EK}$

also $FS \leqq \left\{\begin{matrix} FE+EK-2\sqrt{FE.EK} \\ FK+2KE-2\sqrt{FE.EK} \end{matrix}\right.$

folglich $\left.\begin{matrix} 4FE.EK \\ (FE+EK)^2-\left\{\begin{matrix} (FE-EK)^2 \\ FK^2 \end{matrix}\right. \end{matrix}\right\} \leqq (FE+EK)^2-\left\{\begin{matrix} 2(FE+EK)FS \\ 2(2EK+KF)FS \end{matrix}\right\}+FS^2$

mithin $4EK.FS \leqq \left\{\begin{matrix} FK^2-2KF.FS+FS^2 \\ KS^2 \end{matrix}\right.$

somit $EK.FS \leqq \frac{1}{4}KS^2$

Der Kreis berührt also (Fig. 23.), oder schneidet (Fig. 24.) die Linie TU.

Auch ist $FS \lessgtr FK+2KE-2\sqrt{FE.EK}$

also $FS < FK$

folglich liegt G zwischen K, F.

Ferner ist $KG.GS = UK.ST$
$= FS.EK$

also $GK : KE = FS : SG$

folglich $KG : \left\{\begin{matrix} GK+KE \\ GE \end{matrix}\right\} = FS : \left\{\begin{matrix} FS+SG \\ FG \end{matrix}\right\}$
$OK : HE$

mithin $\left\{\begin{matrix} OK \\ NF \\ p \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} FS \\ \\ q \end{matrix}\right\} = HE : FG$

Zus. 1. (Apoll.)

Für eine andere (Fig. 23.), die Linien AE, KS in L, M schneidende gerade Linie OM ist

$\left\{\begin{matrix} KG.GS \\ SF.KE \end{matrix}\right\} > KM.MS$

also $MK : KE < FS : SM$

folglich $MK : \left\{\begin{matrix} MK+KE \\ ME \end{matrix}\right\} < FS : \left\{\begin{matrix} FS+SM \\ FM \end{matrix}\right\}$ (Hauber §. 25.)
$OK : EL$

mithin $\left\{\begin{matrix} OK : FS \\ EH : FG \end{matrix}\right\} < EL : FM$

Der Punkt G, für welchen $GE = \sqrt{FE.EK}$, bestimmt also ein kleineres Verhältnifs, als jeder andere Punkt der Linie KS.

Macht man EL : FM = OK : FV

so ist OK : FV > OK : FS

also FV < FS

Auch ist $\left.\begin{matrix} EL : OK \\ EM : MK \end{matrix}\right\} = MF : FV$

folglich $\left.\begin{matrix} EM-MK \\ EK \end{matrix}\right\} : KM = \left\{\begin{matrix} MF-FV \\ MV \end{matrix}\right\} : VF$

mithin KM. MV = EK. VF

Ferner ist FS > FV

also $\left.\begin{matrix} EK.FS \\ KG.GS \end{matrix}\right\} > \left\{\begin{matrix} EK.FV \\ KM.MV \end{matrix}\right.$

folglich KG. GV > KM. MV

mithin liegt G dem Halbirungspunkte von KV näher, als M. Ist nun YG > GM, so ist

$$\left.\begin{matrix} KM.MV \\ EK.VF \end{matrix}\right\} > KY.YV$$

also KY : KE < VF : VY

folglich $KY : \left\{\begin{matrix} KY+KE \\ YE \\ OK : EX \end{matrix}\right\} < VF : \left\{\begin{matrix} VF+VY \\ FY \end{matrix}\right\}$

wenn OY der AE in X begegnet,

mithin $\left.\begin{matrix} OK : FV \\ EL : FM \end{matrix}\right\} < EX : FY$

mithin bestimmen die dem Punkte G näher liegenden Punkte der Linie KS kleinere Verhältnisse, als die entfernteren.

Beweis.

Es ist $p:q \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} OK:FS$

$$\left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} OK:FE+EK+2\sqrt{FE.EK}$$

also $FS \left\{ \begin{matrix} = \\ > \end{matrix} \right\} FE+EK+2\sqrt{FE.EK}$

folglich $FS-(FE+EK) \left\{ \begin{matrix} = \\ > \end{matrix} \right\} 2\sqrt{FE.EK}$

mithin

$$FS^2 \left\{ \begin{matrix} 2(FE+EK)\,FS \\ 2(2EK+KF)FS \end{matrix} \right\} + (FE+EK)^2 \left\{ \begin{matrix} = \\ > \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} 4FE.EK \\ (FE+EK)^2-(FE-EK)^2 \end{matrix} \right.$$

somit $FS^2-2KF.FS+FK^2 \left\{ \begin{matrix} = \\ > \end{matrix} \right\} 4EK.FS$

demnach $\frac{1}{4}(FS-FK)^2 \left\{ \begin{matrix} = \\ > \end{matrix} \right\} EK.FS$

$\frac{1}{4}KS^2$

Der Kreis berührt also (Fig. 25.), oder schneidet (Fig. 26.) die Linie TU, so dafs $KG.GS = UK.ST = FS.EK$

folglich $GK:KE = FS:SG$

Da $FS > SG$

so ist $GK > KE$

also liegt der Punkt G auf der Linie EC.

Ferner ist $KG : \left\{ \begin{matrix} GK-KE \\ GE \end{matrix} \right\} = FS : \left\{ \begin{matrix} FS-SG \\ FG \end{matrix} \right\}$

$OK : HE$

somit $OK \,.\, FS \left\{ \begin{matrix} = \\ p \cdot q \end{matrix} \right\} HE : FG$

Zus. 1. (Apoll.)

Für eine andere, die Linien EC, EA (Fig. 25.) in M, L schneidende gerade Linie OM ist

$$\left.\begin{matrix} KG.GS \\ SF.KE \end{matrix}\right\} > KM.MS$$

also $MK : KE < FS : SM$

also bestimmt der Punkt G, für welchen $GE = \sqrt{FE.EK}$, ein gröfseres Verhältnifs, als jeder andere Punkt der Linie ES, und die demselben näher liegenden Punkte bestimmen gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren, welches buchst. wie zu loc. VI. Fall 4. Zus. 1. bewiesen wird.

Zus. 2. (Apoll.)

Errichtet man (Fig. 26.) in dem zweiten Durchschnitte R' der Linie TU und des Kreises ein Perpendikel auf TU, welches der KC in G' begegne, so liegt auch G' auf EC, und wenn OG' der AE in H' begegnet, so ist $p : q = EH' : FG'$, welches eben so bewiesen wird, wie es für EH, FG geschehen ist.

Anm. zu loc. VII.

Wenn das gegebene Verhältnifs

$$p : q \left\{\begin{matrix} = \\ > \end{matrix}\right\} OK : FE + EK - 2\sqrt{FE.EK} \quad \left\{\begin{matrix} = \\ < \end{matrix}\right\} OK : FE + EK + 2\sqrt{FE.EK}$$

, so kann die Aufgabe nach Fall $\left\{\begin{matrix} 1.2.3. \\ 1.3.4. \end{matrix}\right\}$ aufgelöfst werden.

Zweites Buch.

Die gegebenen Linien sind nicht parallel, und die gegebenen Punkte liegen beide aufserhalb des Durchschnittspunktes derselben. (Fig. 27—104.)

Bezeichnet man den Durchschnittspunkt der Linien AB, CD mit I, so liege der auf der Linie AB gegebene Punkt F

I.) auf IB. (Fig. 27 — 69.). (Loc. I—VII.)

Der auf CD gegebene Punkt G liege

1.) auf IC. (Fig. 27 — 29.). (Loc. I.)

Fall 1.

Die gesuchten Segmente sollen liegen auf den Linien FA, GC. (Fig. 27.)

Analysis.

Es sey LX die gesuchte Linie. Zieht man die gerade Linie OF, welche die Linie CD in E schneide, so ist, wenn EH ∥ AB, und H der Durchschnitt der Linien EH, OX ist, FL : EH = FO : OE (El. VI. 4.),

also ist das Verhältniſs FL : EH gegeben (Dat. 28. 2.). Da auch das Verhältniſs FL : GX gegeben ist (p. hyp.), so ist das Verhältniſs EH : GX gegeben (Dat. 9.), mithin die Aufgabe auf lib. I. loc. IV. Fall 1. reducirt.

Construction.

Man ziehe die gerade Linie OF, welche der Linie CD in E begegne, mache OK # EH # VG # AB, OV # FN # CD, NP = p, NQ = q, wenn das gegebene Verhältniſs = p : q, wobey p, q gegebene Linien bezeichnen, VM # PQ, bezeichne den Durchschnitt der Linien FN, VM mit M, nehme MS # AB, bezeichne den Durchschnitt der Linien MS, CD mit S, mache GST = R = SKU, TS = SG, UK = KE, beschreibe über KS als Durchmesser einen Kreis, welcher der geraden Linie TU in R begegne, errichte in R auf TU ein Perpendikel, welches der Linie CD in X begegne, und ziehe OX, welche in L die Linie AB schneide, so sind FL, GX die gesuchten Segmente.

Beweis.

Vermöge lib. I. loc. IV. Fall 1. Bew. ist

$$EH : GX = VG : \begin{cases} GS \\ MN \end{cases}$$

Nun ist FL : EH = FO : OE
= NV : VG (El. VI. 2.)

---

also ist FL : GX = VN : NM (El. V. 20.)
= PN : NQ
= p : q

Zus. 1.

Vermöge lib. I. loc. IV. Fall 1. Zus. 1. ist für eine andere die Linien AI, GS, EH in Z, Y, W schneidende gerade Linie OY

$$EW : GY \left\{\begin{matrix}> \\ <\end{matrix}\right\} VG : \left\{\begin{matrix}GS \\ MN\end{matrix}\right.$$

Da auch $FZ : EW = FO : OE$
$= NV : VG$

so ist $FZ : GY \left\{\begin{matrix}> \\ <\end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix}NV : MN \\ FL : GX\end{matrix}\right.$

Also bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie GS gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Vermöge lib. I. loc. IV. Fall 1. Zus. 2. schneidet ein in dem zweiten Durchschnitte R′ des Kreises und der Linie TU auf dieser Linie errichtetes Perpendikel die Linie EK in einem Punkte X′ so, dafs, wenn OX′ die Linien HE, FB in H′, L′ schneidet,

$$EH' : GX' = VG : \left\{\begin{matrix}GS \\ MN\end{matrix}\right.$$

Nun ist $FL' : EH' = FO : OE$
$= NV : VG$

also $FL' : GX' = NV : MN$
$= p : q$

Es ist mithin auch eine gerade Linie OX′ gefunden, welche von den Linien FB, GK Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 3. ist.

Fall 2.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien GI, FA. (Fig. 28. a.)

Analysis.

Buchst., wie zu Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. IV. Fall 2. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu Fall 1.

Determination.

Da der Punkt X auf der Linie GI liegen soll, so wird $FL \overset{=}{>} FI$, $GX \overset{=}{<} GI$

also $FL : GX \overset{=}{>} FI : IG$ (Hauber §. 41.)

mithin muſs $p : q \overset{=}{>} FI : IG$ seyn.

Beweis.

Es ist vermöge lib. I. loc. IV. Fall 2. Bew.

$EH : GX = VG : GS$

also $FL : GX = p : q$ (buchst., wie Fall 1. Bew.)

Da $\left.\begin{matrix} p : q \\ FL : GX \end{matrix}\right\} \overset{=}{>} FI : IG$ (Det.)

so ist auch $GX \overset{=}{<} GI$, weil sonst auch $FL < FI$

also $FL : GX < FI : IG$ (Hauber §. 41.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien EH, EA, GS in W, Z, Y schneidende gerade Linie OY ist (vermöge lib. I. loc. IV. Fall 2. Zus. 1.) $EW : GY \left\{\begin{matrix} > \\ < \end{matrix}\right\} VG : GS$

also $FZ : GY \gtrless FL : GX$ (wie Fall 1. Zus. 1.)

Es bestimmen also die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie GS kleinere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' der Linie TU und des Kreises ein Perpendikel auf TU, welches der Linie CD in X' begegne, so ist, wenn man die die Linien EH, AB in H', L' schneidende gerade Linie OX' zieht, (vermöge lib. I. loc. IV. Fall 2. Zus. 2.) H'E : GX'=VG : GS

also FL' : GX'=NV : GS (wie Fall 1. Zus. 2.)
= p : q

mithin ist eine Linie OX' gefunden, welche von den Linien FA, GD Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 5. ist.

Fall 3.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FB, GD. (Fig. 27.)

Analysis.

Buchst., wie zu Fall 1., wenn man L', H', X' statt L, H, X setzt, also ist der Fall reducirt auf lib. I. loc. IV. Fall 3.

Construction.

Buchst., wie zu Fall 1., wenn man R', X', H', L' statt R, X, H, L setzt.

Beweis.

Vermöge lib. I. loc. IV. Fall 3. Bew. ist
EH' : GX'=OK : GS

also FL' : GX'=p : q (wie zu Fall 1. Zus. 2.)

Zus. 1.

Vermöge lib. I. loc. IV. Fall 3. Zus. 1. ist für eine andere, die Linien EK, EH, FB in Y', W', Z' schneidende gerade Linie OZ, $EW' : GY' \lesseqgtr VG : \begin{cases} GS \\ MN \end{cases}$

Da $FZ' : EW' = FO : OE$
$= NV : VG$

so ist $FZ' : GY' \left\{\begin{matrix} \leq \\ > \end{matrix}\right\} \begin{cases} NV : NM \\ FL' : GX' \end{cases}$

Es bestimmen also die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie EK kleinere Verhältnisse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Vermöge lib. I. loc. IV. Fall 3. Zus. 2. schneidet ein in dem zweiten Durchschnitte R der Linie TU und des Kreises auf TU errichtetes Perpendikel die Linie GS so, dafs, wenn die die Linien EH, IA in H, L schneidende gerade Linie OX gezogen wird,

$HE : GX = VG : GS$

also ist auch $FL : GX = p : q$ (wie zu Fall 1. Bew.)

Es ist folglich eine gerade Linie OX gefunden worden, welche von den Linien FA, GC Segmente in dem gegebenen Verhältnisse abschneidet, welches Fall 1. ist.

Fall 4.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FI, GD. (Fig. 28. b.)

Analysis.

Buchst., wie zu Fall 1., also ist die Aufgabe reducirt auf lib. I. loc. IV. Fall 2.

Construction.

Buchst., wie zu Fall 1.

Determination.

Da der Punkt X auf IE liegen soll, so wird

$$FL < FI \text{ , } GX > GI$$

also $FL : GX < FI : IG$ (Hauber §. 41)

mithin mufs $p : q < FI : IG$ seyn.

Beweis.

Es ist vermöge lib. I. loc. IV. Fall 2. Bew.

$$EH : GX = VG : GS$$

also $FL : GX = p : q$ (wie Fall 1. Bew.)

Da $\left.\begin{matrix} p : q \\ FL : GX \end{matrix}\right\} < FI : IG$

so ist auch $GX \gtrless GI$, weil sonst $FL \gtrless GI$

also $FL : GX > FI : IG$ (Haub. §. 41.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien EH, EI, IF in W, Y, Z schneidende gerade Linie OZ ist (vermöge lib. I. loc. IV. Fall 2. Zus. 1.) $EW : GY \left\{\begin{matrix} > \\ < \end{matrix}\right\} VG : GS$

also $FZ : GY \gtrless FL : GX$ (wie Fall 1. Zus. 1.) Es bestimmen also die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie EI kleinere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Buchst., wie Fall 2. Zus. 2.

Fall 5.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, GD. (Fig. 29.)

Analysis.

Buchst., wie zu Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. IV. Fall 4. reducirt.

Construction und Beweis.

Buchst., wie zu Fall 1.

Zus. 1.

Vermöge lib. I. loc. IV. Fall 4. Zus. 1. ist für eine andere, die Linien AB, EH, KD in den Punkten Z, W, Y schneidende gerade Linie OY

$$EW : GY \gtrless VG : GS$$

also $FZ : GY \gtrless FL : GX$ (wie Fall 1. Zus. 1.)

Es bestimmen also die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie KD kleinere Verhältnisse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf dieser Linie, so ist (vermöge lib. I. loc. IV. Fall 4. Zus. 2.), wenn die die Linien EH, AB in H', L' schneidende gerade Linie OX' gezogen wird,

$$EH' : GX' = VG : GS$$

also $FL' : GX' = p : q$ (wie Fall 1. Zus. 2.)

Es ist mithin eine Linie OX′ gefunden worden, welche von den Linien GE, FA Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 2., oder Fall 4. ist, je nachdem X′ auf GI, oder EI fällt.

2.) auf ID (Fig. 30—69.), und zwar, wenn die der AB parallel gezogene gerade Linie OK die gerade Linie ID in K schneidet,

A.) in K. (Fig. 30–39.) (Loc. II.)

Fall 1.

Die gesuchten Segmente sollen liegen auf den Linien GD, FA. (Fig. 30.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. V. Fall 1. reducirt.

Construction.

Man ziehe die gerade Linie OF, welche der IK in E begegne, mache OKN ∥ EH ∥ AB, FNM ∥ CD, NP = p, NQ = q, OM ∥ PQ, MS ∥ AB, bezeichne den Durchschnitt der Linien CD, MS mit S, beschreibe über KS als Durchmesser einen Kreis, mache UKS = KST = R, UK = KE, TS = SG, ziehe TU, errichte in dem Durchschnitte R des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, welches der KD in X begegne, und ziehe OX, welche die IA in L schneide, so sind FL, GX die gesuchten Segmente.

Beweis.

Vermöge lib. I. loc. V. Fall 1. Bew. ist

$$EH : GX = OK : \begin{cases} GS \\ MN \end{cases}$$

Auch ist $FL : EH = FO : OE$
$= NO : OK$

---

also ist $FL : GX = ON : NM$
$= PN : NQ$
$= p : q$

Zus. 1.

Vermöge lib. I. loc. V. Fall 1. Zus. 1. ist, für eine andere, die Linien EH, IA, SD in W, Z, Y schneidende gerade Linie OY, $EW : GY \lesseqgtr OK : \begin{cases} GS \\ MN \end{cases}$

Nun ist $FZ : EW = FO : OE$
$= NO : OK$

---

also ist $FZ : GY \lesseqgtr \begin{cases} ON : NM \\ p : q \end{cases}$

Mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie SD kleinere Verhältnisse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf dieser Linie, welches der EK in X' begegne, so ist, wenn die Linie OX' gezogen wird, und mit H', L' die Durchschnittspunkte derselben mit EH, AB bezeichnet werden, (vermöge lib. I. loc. V. Fall 1. Zus. 2.)

$$EH' : GX' = OK : \begin{cases} GS \\ MN \end{cases}$$

Nun ist $FL' : EH' = FO : OE$
$= NO : OK$

also ist $FL' : GX' = ON : NM$
$= p : q$

Es ist mithin auch eine gerade Linie OX' gefunden, welche von den Linien FB, GI Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 2. ist.

Fall 2.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FB, KI. (Fig. 30.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., wenn man daselbst H', L', X' statt H, L, X setzt, also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. V. Fall 2. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu Fall 1., wenn man R', X', H', L' statt R, X, H, L setzt.

Beweis.

Vermöge lib. I. loc. V. Fall 2. Bew. schneidet R'X' die Linie GE so, dafs $EH' : GX' = OK : GS$

also ist $FL' : GX' = p : q$ (buchst., wie zu Fall 1. Zus. 2.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien GE, EH', FB in Y', W', Z' schneidende gerade Linie OZ' ist (vermöge lib. I. loc. V. Fall 2. Zus. 1.)

$$EW' : GY' \gtrless OK : \begin{cases} GS \\ MN \end{cases}$$

Es ist aber $FZ' : EW' = FO : OE$
$= NO : OK$

also ist $FZ' : GY' \gtrless \begin{cases} ON : NM \\ p : q \end{cases}$

mithin bestimmen die, dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie KE kleinere Verhältnisse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, welches der Linie SD in X begegne, so ist, wenn die die Linien EH, IA in H, L schneidende gerade Linie OX gezogen wird, (vermöge lib. I. loc. V. Fall 2. Zus. 2.) $EH : GX = OK : GS$

also $FL : GX = p : q$ (buchst., wie Fall 1. Bew.)

Es ist mithin eine Linie OX gefunden, welche von den Linien GD, FA Segmente in dem gegebenen Verhältnisse abschneidet, welches Fall 1. ist.

Fall 3.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FI, IG. (Fig. 31—35.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. V. Fall 3. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. II. Fall 1.

α.) Es sey KE < EI. (Fig. 31. 32.)

κ) Es sey p : q < OK+FI : 2KI. (Fig. 31.)

Determination.

Da $p \cdot q \left\{ < \right\} \begin{matrix} OK+FI \\ ON \end{matrix} \left\} : 2IK \right.$
$ON : NM \left\{ \right.$

so wird $MN \left\{ \right. > 2IK$ (El. V. 10.)
$KS \left\{ \right.$

also $K\alpha > KI$, wenn $K\alpha = \alpha S$.

Damit nun der Punkt X auf EI liege, muſs mithin seyn $KI \overset{=}{>} K\alpha - \alpha X$.

Es ist aber $KX.XS \left\{ \right. = EK.GS$ (Lehns. A.)
(El. II. 5.) $K\alpha^2 \left\{ \right. - \alpha X^2 \left\}$
$\frac{1}{4}KS^2 \left\{ \right.$

also $\alpha X = \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - EK.GS}$

folglich muſs seyn $KI \overset{=}{>} \frac{1}{2}KS - \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - EK.GS}$

mithin $\frac{1}{4}KS^2 - EK.GS \overset{=}{>} \frac{1}{4}KS^2 - IK.KS + KI^2$

somit $IK.KS - EK.GS \left\{ \right. \overset{=}{>} KI^2$
$IE.KS \left\{ \right.$

demnach $KI : IE \left\{ \right. \overset{=}{<} \begin{matrix} SK \\ MN \end{matrix} \left\} : KI \right.$ (Hauber §. 53.)
$OF : FE \left\{ \right.$
$ON : \begin{matrix} NK \\ FI \end{matrix} \left\{ \right.$

also $ON : NM \left\{ \right. \overset{=}{<} FI : IK$
$p : q \left\{ \right.$

Beweis.

Es ist $p : q < OK+FI : 2IK$

also auch $\left.\begin{matrix} p : q \\ ON : NM \end{matrix}\right\} < \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ ON \end{matrix}\right\} : 4KE$

folglich $\left.\begin{matrix} MN \\ GS \end{matrix}\right\} > 4KE$

mithin schneidet der Kreis die Linie TU (lib. I. loc. V. Fall 3. Bew.).

Ferner ist $\left.\begin{matrix} p : q \\ ON : NM \end{matrix}\right\} \leqq FI : IK$

also $ON : \left\{\begin{matrix} FI \\ NK \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} = \\ < \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} MN \\ KS \end{matrix}\right\} : KI$

$OF : FE$

$KI : IE$

folglich $\left.\begin{matrix} IE.KS \\ (IK-KE)\,KS \end{matrix}\right\} \gtrless KI^2$ (Hauber §. 52.)

mithin $\frac{1}{4}KS^2-EK.KS \gtrless \frac{1}{4}KS^2-IK.KS+KI^2$

somit $\sqrt{\frac{1}{4}KS^2-EK.KS} \gtrless \frac{1}{2}KS-KI$

demnach $KI \gtrless \left\{\begin{matrix} \frac{1}{2}KS-\sqrt{\frac{1}{4}KS^2-EK.KS} \\ KX \end{matrix}\right.$

Auch ist $EH : GX' = OK : GS$ (lib. I. loc. V. Fall 3.)

also $FL : GX = p : q$ (wie Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Macht man $E\varepsilon = KE$ und zieht $O\varepsilon$, welche den Linien IF, EH in λ, μ begegne, so ist (vermöge lib. I.

loc. V. Fall 3. Zus. 1.), wenn auch eine die Linien EH, EI, IF in W, Y, Z schneidende gerade Linie OZ gezogen wird, $EW : GY < E\mu : G\varepsilon$

also $\left.\begin{matrix} EW : E\mu \\ FZ : F\lambda \end{matrix}\right\} < GY : G\varepsilon$

folglich $FZ : GY < F\lambda : G\varepsilon$

mithin bestimmt der Punkt ε ein gröfseres Verhältnifs, als jeder andere Punkt der Linie EI.

Ferner ist, wenn $X\varepsilon < \varepsilon Y$, (vermöge desselben Zusatzes) $EH : GX > EW : GY$

also $\left.\begin{matrix} EH : EW \\ FL : FZ \end{matrix}\right\} > GX : GY$

folglich $FL : GX > FZ : GY$

mithin bestimmen die dem Punkte ε näher liegenden Punkte der Linie EI gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' der Linie TU und des Kreises ein Perpendikel auf TU, welches die Linie CI in X' schneide, so ist, wenn die die Linien EH, IC in H', L' schneidende gerade Linie OX' gezogen wird,

$EH' : GX' = OK : GS$ (lib. I. loc. V. Fall 3. Zus. 2.)

also $FL' : GX' = p : q$ (wie Fall 1. Zus. 2.)

mithin ist eine Linie OX' gefunden, welche von den Linien FA, GC Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 4. ist.

3.) Es sey $p : q = OK + FI : 2IK$ (Fig. 31.)

Beweis.

Es ist $p : q = OK + FI : 2IK$

also $p : q \left\{ \begin{matrix} \\ ON : NM \end{matrix} \right\} < \left\{ \begin{matrix} OK + FI \\ ON \end{matrix} \right\} : 4KE$

folglich $MN \left\{ \begin{matrix} \\ KS \end{matrix} \right\} > 4KE$

mithin schneidet der Kreis die Linie TU.

Ferner ist $p : q \left\{ \begin{matrix} \\ ON : \left\{ \begin{matrix} NM \\ KS \end{matrix} \right. \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} OK + FI \\ ON \end{matrix} \right\} : 2IK$

also $KS = 2IK$

folglich $K\alpha = KI$ wenn $K\alpha = \alpha S$,

mithin $KX < KI$

Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. V. Fall 3.)

somit $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall. 1. Bew.)

Zusätze.

Büchst., wie zu N.

2.) Es sey $p : q > OK + FI : 2IK$. (Fig. 32. 33.)

Determination.

Damit der Kreis die Linie TU erreiche, muſs seyn $KS = > 4KE$ (lib. I. loc. V. Fall 3. Det.)

also $ON : \left\{ \begin{matrix} KS \\ NM \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} \\ p : q \end{matrix} \right\} = < \left\{ \begin{matrix} ON : 4KE \\ ON^2 : 4KE . ON \\ (OK + FI)^2 : 4IK . KO \end{matrix} \right.$

Beweis.

$$\text{Es ist } p:q \left\{\begin{matrix}=\\<\\>\end{matrix}\right\} \begin{cases}(OK+FI)^2 : 4IK.KO\\ ON^2 : 4KE.ON\\ ON : 4KE\end{cases}$$
$$ON : \begin{cases}NM\\KS\end{cases}$$

$$\text{also } KS \left\{\begin{matrix}=\\<\\>\end{matrix}\right\} 4KE$$

folglich berührt (Fig. 32.), oder schneidet (Fig. 33.) der Kreis die Linie TU.

$$\text{Ferner ist } p:q \left\{\begin{matrix}=\\<\\>\end{matrix}\right\} \begin{cases}OK+FI\\ ON\end{cases} : 2KI$$
$$ON : \begin{cases}NM\\KS\end{cases}$$

also $KS < 2KI$ (El. V. 10.)

folglich $K\alpha < KI$, wenn $K\alpha = \alpha S$,

mithin auch $KX < KI$

Ueberdiefs ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. V. Fall 3.)

also $FL : GX = p : q$ (wie Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine in Fig. 32. die Linien EH, EI, FI in W, Y, Z schneidende gerade Linie OZ ist

$EW : GY < OK : GS$ (lib. I. loc. V. Fall 3. Zus. 1.)

Es ist aber $FZ : EW = FO : OE$
$= NO : OK$

$$\text{also ist } FZ : GY < \begin{cases}ON : \begin{cases}GS\\NM\end{cases}\\ p:q\end{cases}$$

mithin bestimmt der Punkt X, für welchen $EX = EK$, ein gröfseres Verhältnifs, als jeder andere Punkt der Linie EI.

Für eine andere, die Linien EH, EI, FI in β, γ, δ schneidende gerade Linie Oδ ist, wenn $\gamma\alpha > \alpha Y$,

$E\beta : G\gamma < EW : GY$ (lib. I. loc. V. Fall 3. Zus. 1.)

Es ist aber $F\delta : E\beta = FO : OE$
$= FZ : EW$

also ist $F\delta : G\gamma < FZ : GY$

mithin bestimmen die dem Punkte X näher liegenden Punkte gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in Fig. 33. in dem zweiten Durchschnitte R′ der Linie TU und des Kreises ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie EC zwischen E, I, oder in I, oder zwischen I, S, in dem Punkte X′, je nachdem $KI \begin{Bmatrix} < \\ = \\ > \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} KX' \\ K\alpha + \alpha X, \end{Bmatrix}$

das heifst, da $\begin{matrix} KX.XS \\ K\alpha^2 \\ \frac{1}{4}KS^2 \end{matrix} \Big\} = \begin{matrix} EK.KS \\ -\alpha X^2 \end{matrix} \Big\}$

also $\alpha X = \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - EK.KS}$

je nachdem $KI \begin{Bmatrix} < \\ = \\ > \end{Bmatrix} \frac{1}{2}KS + \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - EK.KS}$

folglich $KI^2 - IK.KS + \frac{1}{4}KS^2 \begin{Bmatrix} < \\ = \\ > \end{Bmatrix} \frac{1}{4}KS^2 - EK.KS$

mithin $KI^2 \begin{Bmatrix} < \\ = \\ > \end{Bmatrix} \begin{matrix} IK.KS - EK.KS \\ IE.KS \end{matrix}$

somit $\begin{matrix} KI : IE \\ OF : FE \\ ON : \begin{matrix} NK \\ FI \end{matrix} \end{matrix} \Big\} \begin{Bmatrix} < \\ = \\ > \end{Bmatrix} \begin{matrix} SK \\ NM \end{matrix} \Big\} : KI$

demnach $ON : NM \left\{\begin{matrix}<\\=\\>\end{matrix}\right\} FI : IK$
$p : q$

Auch ist, wenn die die Linien EH, FA in H', L' schneidende gerade Linie OL' gezogen wird,

$EH' : GX' = OK : GS$ (lib. I. loc. V. Fall 3. Zus. 2.)

also $FL' : GX' = p : q$ (wie Fall 1. Zus. 2.)

β.) Es sey KE=EI. (Fig. 34. 35. a.)

Determination.

Da (vermöge lib. I. loc. V. Fall 3. Det.)

$KS \overset{=}{>} 4KE$

so wird $KS \overset{=}{>} 2KI$

folglich $K\alpha \overset{=}{>} KI$, wenn $K\alpha = \alpha S$.

Damit der Punkt X auf EI liege, mufs also seyn

$KI \overset{=}{>} K\alpha - \alpha X$

Nun ist $KX . XS = EK . GS$

also mufs seyn $p : q \overset{=}{<} FI : IK$ (wie zu α. δ. Det.)

Beweis.

Es ist $OK : FI = KE : EI$

mithin $OK = FI$

somit $2OK . FI = OK^2 + FI^2$

also $4OK . FI = (OK + FI)^2$

folglich $\left.\begin{matrix}4OK.FI : 4IK.KO\\FI : IK\end{matrix}\right\} = (OK+FI)^2 : 4IK.KO$

Es ist aber $p : q \overset{=}{<} FI : IK$

$$\text{mithin } p:q \left\{\begin{matrix}=\\<\end{matrix}\right\} \begin{cases} (OK+FI)^2 : 4IK.KO \\ ON^2 : 4KE.ON \\ ON : 4KE \end{cases}$$

$$\text{somit } \begin{matrix} MN \\ KS \end{matrix} \left\{\begin{matrix}=\\>\end{matrix}\right\} 4KE$$

Demnach berührt (Fig. 34.), oder schneidet (Fig. 35. a.) der Kreis die Linie TU.

$$\text{Ferner ist } p:q \left\{\begin{matrix}=\\<\end{matrix}\right\} FI:IK$$

$$\text{also } KI \left\{\begin{matrix}=\\>\end{matrix}\right\} KX \text{ (buchst., wie } \alpha. \text{ N. Bew.)}$$

also liegt der Punkt X auf der Linie KI.
Auch ist EH : GX = OK : GS (lib. I. loc. V. Fall 3. Bew.)

also FL : GX = p : q (wie Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Buchst., wie α. 3. Zus. 1., in Beziehung auf Fig. 34.

Zus. 2.

Errichtet man (Fig. 35. a.) in dem zweiten Durchschnitte R' der Linie TU und des Kreises ein Perpendikel auf TU, welches die Linie IC in X' schneide, so ist, wenn die die Linien EH, IS in H', L' schneidende gerade Linie OX' gezogen wird,

EH' : GX' = OK : GS (lib. I. loc. V. Fall 3. Zus. 2.)

also FL' : GX' = p : q (wie zu Fall 1.)
folglich ist eine Linie OX' gefunden, welche von den Linien FA, GC Segmente in dem gegebenen Verhältnisse abschneidet, welches Fall 4. ist.

γ.) Es sey KE > EI. (Fig. 35. b.)

Determination.

Buchstäblich, wie β. Det.

Beweis.

Es ist $OK : FI = KE : EI$

also $OK > FI$

folglich $2OK.FI < OK^2 + FI^2$

mithin $4OK.FI < (OK+FI)^2$

somit $\left.\begin{matrix} 4OK.FI : 4IK.KO \\ FI : IK \end{matrix}\right\} < (OK+FI)^2 : 4IK.KO$

Es ist aber $p : q \overset{=}{<} FI : IK$

also $\left.\begin{matrix} p : q \\ ON : NM \end{matrix}\right\} < \left\{\begin{matrix} (OK+FI)^2 : 4IK.KO \\ ON^2 : 4KE.ON \\ ON : 4KE \end{matrix}\right.$

folglich $\left.\begin{matrix} MN \\ GS \end{matrix}\right\} > 4KE$

mithin schneidet der Kreis die Linie TU.

Ferner ist $p : q \overset{=}{<} FI : IK$

also $KI \overset{=}{>} KX$ (wie α. N. Bew.)

folglich liegt der Punkt X auf der Linie KI.

Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. V. Fall 3. Bew.)

also $FL : GX = p : q$ (wie zu Fall 1. Bew.)

Zuss. 1. 2.

Buchst., wie α. N. Zuss. 1. 2.

Fall 4.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, KC. (Fig. 34. 36—39.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. V. Fall 3. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. II. Fall 1.

α.) Es sey KE>EI. (Fig. 36. 37.)

Determination.

Vermöge lib. I. loc. V. Fall 3. Det. muſs seyn

$$\left.\begin{matrix} KS \\ MN \end{matrix}\right\} \gtrless 4KE$$

$$\text{also } ON : NM \left\{\begin{matrix} = \\ < \end{matrix}\right. \begin{cases} ON : 4KE \\ ON^2 : 4KE.ON \\ (OK+FI)^2 : 4IK.KO. \end{cases}$$

$$p : q$$

Beweis.

$$\text{Es ist } p : q \left\{\begin{matrix} = \\ < \end{matrix}\right. \begin{matrix} (OK+FI)^2 : 4IK.KO \text{ (Det.)} \\ ON : 4KE \end{matrix}$$

$$\text{also } MN \left\{\begin{matrix} = \\ > \end{matrix}\right. 4KE$$
$$KS$$

folglich berührt (Fig. 36.), oder schneidet (Fig. 37.) der Kreis die Linie TU.

Da KE>EI

$$\text{so ist } 2KE > \begin{matrix} KE+EI \\ KI \end{matrix}$$

$$\text{also } 4KE > 2KI$$

$$\text{folglich } \left.\begin{matrix} KS \\ 2K\alpha \end{matrix}\right\} > 2KI \qquad \text{wenn } K\alpha = \alpha S,$$

$$\text{mithin } K\alpha > KI$$

demnach liegt X auf IC.

Auch ist EH : GX = OK : GS (lib. I. loc. V. Fall 3. Beww.)

also FL : GX = p : q (wie Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine die Linien EH, IS, IA (Fig. 36.) in W, Y, Z schneidende gerade Linie OY ist

EW : GY < OK : GS (lib. I. loc. V. Fall 3. Zus. 1.)

Es ist aber FZ : EW = FO : OE
= NO : OK

also ist FZ : GY < (ON : GS, NM) p : q

mithin bestimmt der Punkt X, für welchen αE = EK, ein gröfseres Verhältnifs, als jeder andere Punkt der Linie IS.

Für eine andere die Linien EH, IC, IA in β, γ, δ schneidende gerade Linie Oγ ist

Eβ : Gγ < EW : GY (lib. I. loc. V. Fall 3. Zus. 1.)

Es ist aber Fδ : Eβ = FO : OE
= FZ : EW

also ist Fδ : Gγ < FZ : GY

mithin bestimmen die diesem Punkte X näher liegenden Punkte gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' (Fig. 37.) ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie EC zwischen I, C, oder in I, oder zwischen E, I, in einem Punkte X',

je nachdem $K\alpha \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} \alpha X'$ KI

oder da $KX.XS \left\{\begin{matrix}\\\\\end{matrix}\right\} = EK.KS$
$K\alpha^2 \left\{\begin{matrix}\\\\\end{matrix}\right\} -\alpha X'^2$
$\frac{1}{4}KS^2 \left\{\begin{matrix}\\\\\end{matrix}\right\}$

also $\alpha X' = \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - EK.KS}$

je nachdem $\frac{1}{2}KS - \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - EK.KS} \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\}$ KI

folglich $\frac{1}{4}KS^2 - IK.KS + KI^2 \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} \frac{1}{4}KS^2 - EK.KS$

mithin $KI^2 \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix}(IK-KE)KS\\IE.KS\end{matrix}\right.$

somit $\left.\begin{matrix}SK\\MN\end{matrix}\right\} : KI \left\{\begin{matrix}<\\=\\>\end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix}KI : IE\\OF : FE\\ON : \left\{\begin{matrix}NK\\FI\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.$

demnach $MN : NO \left\{\begin{matrix}<\\=\\>\end{matrix}\right\} KI : IF$

also $\left.\begin{matrix}ON : NM\\p : q\end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} FI : IK$

Auch ist $EH' : GX' = OK : GS$

also $FL' : GX' = p : q$ (wie Fall 1. Zus. 2.).

β.) Es sey KE=EI. (Fig. 34. 38.)

Determination.

Buchst., wie α. Det.

Beweis.

Es ist $p : q \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right. \left\{ \begin{matrix} (OK+FI)^2 : 4IK.KO \\ ON^2 : 4KE.ON \\ ON : 4KE \end{matrix} \right.$

also $MN \left\{ \begin{matrix} = \\ > \end{matrix} \right. 4KE$
KS

folglich berührt (Fig. 34.), oder schneidet (Fig. 38.) der Kreis die Linie TU.

Da $KE = EI$

so ist $2KE = \left\{ \begin{matrix} KE+EI \\ KI \end{matrix} \right.$

also $4KE = 2KI$

folglich $KS \left\{ \begin{matrix} = \\ > \end{matrix} \right. 2KI$
$2K\alpha$ wenn $K\alpha = \alpha S$

mithin $K\alpha \left\{ \begin{matrix} = \\ > \end{matrix} \right. KI$

somit liegt der Punkt X auf IC.

Auch ist EH : GX = OK : GS (lib. I. loc. VII. Fall 3. Bew.)

also FL : GX = p : q (wie Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere (Fig. 34.), die Linien EH, IA, IS in W, Z, Y schneidende gerade Linie OY ist

$EW : GY < OK : GS$

also $FZ : GY < p : q$ (wie Fall 3. α. 3. Zus. 1.)

folglich bestimmt dieser Punkt X ein gröfseres Verhältnifs, als jeder andere Punkt der Linie IS.

Für eine andere, die Linien EH, IA, IS in β, δ, γ schneidende gerade Linie $O\delta$ ist, wenn $\gamma\alpha > \alpha Y$,

$E\beta : G\gamma < EW : GY$

also $F\delta : G\gamma < FZ : GY$ (wie ebendaselbst)

folglich bestimmen die dem Punkte X näher liegenden Punkte gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man (Fig. 38.) in dem zweiten Durchschnitte R' der Linie TU und des Kreises ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe u. s. w. buchst., wie zu α. Zus. 2.

γ.) Es sey KE<EI. (Fig. 39.)

N.) Es sey $p : q < OK + FI : 2KI$. (Fig. 39. a.)

Beweis.

Da $p : q < OK + FI : 2KI$

so ist auch $p : q \left\{ \begin{matrix} < \\ \end{matrix} \right\} \begin{matrix} OK+FI \\ ON \end{matrix} \left\} \begin{matrix} \\ \end{matrix} \right. : 4KE$

$ON : NM$

also $\left. \begin{matrix} MN \\ KS \end{matrix} \right\} > 4KE$

folglich schneidet der Kreis die Linie TU.

Da $p : q \left\{ \begin{matrix} < \\ \end{matrix} \right\} \begin{matrix} OK+FI \\ ON \end{matrix} \left\} \begin{matrix} \\ \end{matrix} \right. : 2KI$

$ON : NM$

so ist $\left. \begin{matrix} MN \\ 2K\alpha \end{matrix} \right\} > 2KI$ wenn $K\alpha = \alpha S$,

also $K\alpha > KI$

folglich liegt der Punkt X auf IC.

Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. V. Fall 3. Bew.)

also $FL : GX = p : q$ (wie Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Macht man $E\varepsilon = EK$, und zieht die, die Linien EH, FI in μ, λ schneidende gerade Linie $O\varepsilon$, so ist (vermöge lib. I. loc. V. Fall 3. Zus. 1.), wenn auch eine die Linien EH, IS, IA in W, Y, Z schneidende gerade Linie OY gezogen wird, $EW : GY < E\mu : G\varepsilon$

$$\text{also } \left.\begin{matrix} EW : E\mu \\ FZ : F\lambda \end{matrix}\right\} < GY : G\varepsilon$$

folglich $FZ : GY < F\lambda : G\varepsilon$

mithin bestimmt der Punkt ε ein gröfseres Verhältnifs, als jeder Punkt der Linie εS.

Ferner ist, wenn $X\varepsilon > \varepsilon Y$, $EH : GX < EW : GY$

$$\text{also } \left.\begin{matrix} EH : EW \\ FL : FZ \end{matrix}\right\} < GX : GY$$

folglich $FL : GX < FZ : GY$

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie IS gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Buchst., wie α. Zus. 2.

3.) Es sey $p : q = OK + FI : 2KI$. (Fig. 39. b.)

Beweis.

Da $p : q = OK + FI : 2KI$

$$\text{so ist } \left.\begin{matrix} p : q \\ ON : NM \end{matrix}\right\} < \left\{\begin{matrix} OK + FI \\ ON \end{matrix}\right\} : 4KE$$

$$\text{also } \left.\begin{matrix} MN \\ KS \end{matrix}\right\} > 4KE$$

folglich schneidet der Kreis die Linie TU.

Da $p : q \left\{ \begin{matrix} \\ ON : NM \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} OK+FI \\ ON \end{matrix} \right\} : 2KI$

so ist $\left\{ \begin{matrix} MN \\ KS \\ 2K\alpha \end{matrix} \right\} = 2KI$ wenn $K\alpha = \alpha S$

also $K\alpha = KI$

folglich liegt der Punkt X auf der Linie IC.

Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. V. Fall 3. Bew.)

also $FL : GX = p : q$ (wie Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Buchst., wie N. Zus. 1.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' der Linie TU und des Kreises ein Perpendikel auf TU, welches die Linie EI in X' schneide, so ist, wenn die, die Linien EH, IF in H', L' schneidende gerade Linie OL' gezogen wird, (verm. lib. I. loc. V. Fall 3. Zus. 2.) $EH' : GX' = OK : GS$

also $FL' : GX' = p : q$ (wie Fall 1. Zus. 2.)

folglich ist auch eine Linie OL'. gefunden, welche von den Linien GI, IF Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 3. ist.

2.) Es sey $p : q > OK+FI : 2KI$. (Fig. 39. c.)

Determination.

Vermöge lib. I. loc. V. Fall 3. Det. mufs seyn

$KS \left\{ \begin{matrix} = \\ > \end{matrix} \right\} 4KE$

also $p : q \overset{=}{<} (OK+FI)^2 : 4IK.KO$ (wie zu α.)

$$\text{Da } p : q \left.\begin{matrix} \\ \\ \end{matrix}\right\} > \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ ON \end{matrix}\right\} : 2KI$$
$$ON : \left\{\begin{matrix} NM \\ KS \end{matrix}\right\}$$

$$\text{so ist } \left.\begin{matrix} KS \\ 2K\alpha \end{matrix}\right\} < 2KI \qquad \text{wenn } K\alpha = \alpha S$$

---

also $K\alpha < KI$

Damit nun der Punkt X auf IC falle, muſs

$$KI \overset{=}{<} K\alpha + \alpha X \text{ seyn.}$$

$$\text{Es ist aber } \left.\begin{matrix} KX.XS \\ K\alpha^2 \\ \frac{1}{4}KS^2 \end{matrix}\right\} \left.\begin{matrix} \\ -\alpha X^2 \\ \\ \end{matrix}\right\} = EK.GS$$

$$\text{also } \alpha X = \sqrt{\tfrac{1}{4}KS^2 - EK.GS}$$

$$\text{folglich muſs seyn } KI \overset{=}{<} \tfrac{1}{2}KS + \sqrt{\tfrac{1}{4}KS^2 - EK.GS}$$

$$\text{mithin } KI^2 - IK.KS + \tfrac{1}{4}KS^2 \overset{=}{<} \tfrac{1}{4}KS^2 - EK.GS$$

$$\text{somit } KI^2 \overset{=}{<} \left\{\begin{matrix} (IK-KE)GS \\ IE.GS \end{matrix}\right.$$

$$\text{demnach } \left.\begin{matrix} GS \\ MN \end{matrix}\right\} : IK \overset{=}{<} \left\{\begin{matrix} KI : IE \\ OF : FE \\ ON : \left\{\begin{matrix} NK \\ FI \end{matrix}\right. \end{matrix}\right.$$

$$\text{also } \left.\begin{matrix} MN : NO \\ q : p \end{matrix}\right\} \overset{=}{<} KI : IF$$

$$\text{folglich } p : q \overset{=}{>} FI : IK$$

Beweis.

Es ist $p : q \gtreqless (OK+FI)^2 : 4IK.KO$ (Det)

also $KS \gtreqless 4KE$ (wie zu α.)

folglich schneidet der Kreis die Linie TU.

Ferner ist $p : q \gtreqless FI : IK$

also $KI \lesseqgtr KX$ (wie leicht aus der Det. erhellet.

Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. V. Fall 3.)

also $FI : GX = p : q$ (wie Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Buchst., wie N. Zus. 1.

Zus. 2.

Buchst., wie 2. Zus. 2.

B.) auf der Verlängerung von IK. (Fig. 40—49.) (Loc. III.)

Fall 1.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, GD. (Fig. 40.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VII. Fall 1. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Beweis.

Vermöge lib. I. loc. VII. Fall 1. Bew. ist

$EH : GX = VG : GS$

also $FL : GX = p : q$ (w. zu lib. II. loc. I. Fall 1. Beww.)

Zus. 1.

Vermöge lib. I. loc. VII. Fall 1. Zus. 1. ist, wenn dieß die Linien AB, EH, CD in Z, W, Y schneidende gerade Linie OY gezogen wird, $EW : GY \gtrless VG : \begin{cases} GS \\ MN \end{cases}$

also auch $FZ : GY \gtrless p : q$

folglich bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie SD gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Vermöge lib. I. loc. VII. Fall 1. Zus. 2. ist, wenn man in dem zweiten Durchschnitte R′ des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU aufrichtet, welches den Linien KE, EH, FB in X′, H′, L′ begegnet, $EH' : GX' = VG : GS$

also $FL' : GX' = p : q$ (w. zu lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Es ist mithin auch eine von den Linien FB, GI Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidende gerade Linie OL′ gefunden, welches Fall 3. ist.

Fall 2.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, GK. (Fig. 41. 42.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VII. Fall 2. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 2.

Determination.

Vermöge lib. I. loc. VII. Fall 2. Det. mufs seyn

$$GS \lessgtr GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$$

also $VN : \left\{\begin{matrix} GS \\ NM \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} = \\ > \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} VN \\ OK+FI \end{matrix}\right\} : GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$

$p : q$

Beweis.

Es ist $p : q \left\{\begin{matrix} = \\ > \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix}\right\} : GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$ (Det.)

$VN : \left\{\begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix}\right\}$

folglich $GS \lessgtr GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$

mithin berührt (Fig. 41.), oder schneidet (Fig. 42.) der Kreis die Linie TU, so dafs

$EH : GX = VG : GS$ (lib. I. loc. VII. Fall 2. Bew.)

also $FL : GX = p : q$ (wie zu lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Vermöge lib. I. loc. VII. Fall 1. Zus. 1. ist in Fig. 41., wenn die gerade Linie OY gezogen wird, welche die Linien KS, EH, AB in Y, W, Z schneide,

$$EW : GY > VG : \left\{\begin{matrix} GS \\ MN \end{matrix}\right.$$

Es ist aber $FZ : EW = FO : OE$

$= NV : VG$

also ist $FZ : GY > \left\{\begin{matrix} VN : NM \\ p : q \end{matrix}\right.$

mithin bestimmt der Punkt X, für welchen $EX = \sqrt{KE.EG}$, ein kleineres Verhältnifs, als jeder andere Punkt der Linie KS.

Ferner ist (vermöge desselben Zus.), wenn die die Linien KS, EH, AB in γ, β, δ schneidende gerade Linie $O\gamma$ gezogen wird, und $\gamma X > YX$ ist,

$$EW : GY < E\beta : G\gamma$$

Es ist aber $FZ : EW = FQ : OE$
$= F\delta : E\beta$

---

also ist auch $FZ : GY < F\delta : G\gamma$

mithin bestimmen die dem Punkte X näher liegenden Punkte der Linie KS kleinere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in Fig. 42. in dem zweiten Durchschnitte R' der Linie TU und des Kreises ein die Linie KS in X' schneidendes Perpendikel auf TU, und zieht man die die Linien EH, AB in H', L' schneidende gerade Linie OX', so ist (vermöge lib. I. loc. VII. Zus. 2.) $EH' : GX' = OK : GS$

---

also $FL' : GX' = p : q$ (w. z. lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.) mithin ist eine zweite Linie OX' gefunden, welche von den Linien FA, GK Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet.

Fall 3.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FB, GI. (Fig. 40.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., wenn man X', H', L' statt X, H, L setzt, also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VII. Fall 3. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., wenn man R', X', H', L' statt R, X, H, L setzt.

Beweis.

Es ist $EH' : GX' = OK : GS$ (lib. I. loc. VII. Fall 3. Bew.)

also $FI' : GX' = p : q$ (w. z. lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien EK, EH, FB in Y', W', Z' schneidende gerade Linie OZ' ist

$$EW' : GY' \lesseqgtr OK : GS \quad \text{(lib. I. loc. VII. Fall 3. Z. 1.)}$$

Es ist aber $FZ' : EW' = FO : OE$
$= NV : VG$

also ist $FZ' : GY' \lesseqgtr \begin{cases} NV : GS \\ \qquad\quad MN \\ p : q \end{cases}$

folglich bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie EK kleinere Verhältnisse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R der Linie TU und des Kreises ein die Linie GD in X' schneidendes Perpendikel auf TU, so ist, wenn die die Linien EH, AB in H, L schneidende gerade Linie OX gezogen wird,

$EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VII. Fall 3. Zus. 2.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Fall 4.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FI, IG. (Fig. 43—46.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VII. Fall 4. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

α.) Es sey $EI = \sqrt{GE.EK}$. (Fig. 43. 44.)

Determination.

Da (vermöge lib. I. loc. VII. Fall 4. Det.)

$$GS \overset{=}{>} GE + EK + \left\{ \begin{array}{l} 2\sqrt{GE.EK} \\ 2EI \end{array} \right. \text{ werden muſs,}$$

so wird $\left. \begin{array}{r} KS \\ 2K\alpha \end{array} \right\} \overset{=}{>} 2KI$ wenn $K\alpha = \alpha S$,

also $K\alpha \overset{=}{>} KI$

folglich muſs, damit der Punkt X auf EI falle, werden $KI \overset{=}{>} K\alpha - \alpha X$.

$$\text{Nun ist } \left. \begin{array}{r} KX.XS \\ K\alpha^2 \\ \frac{1}{4}KS^2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} = EK.GS \\ -\alpha X^2 \end{array}$$

also $\sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - EK.GS} = \alpha X$

folglich muſs seyn $KI \gtreqless \frac{1}{2}KS - \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - EK.GS}$

mithin $\frac{1}{4}KS^2 - EK.GS \gtreqless \frac{1}{4}KS^2 - IK.KS + KI^2$

somit $\left.\begin{matrix} IK.KS \\ IK(SG-GK) \\ (IK-KE)GS \\ EI.GS \end{matrix}\right\} - EK.GS \left.\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\right\} \gtreqless KI^2$

$\left.\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\right\} - IK.KG \left.\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\right\}$

demnach $EI.GS \gtreqless \left\{\begin{matrix} KI(IK+KG) \\ KI.IG \end{matrix}\right.$

also $\left.\begin{matrix} KI : IE \\ OF : FE \\ VN : NG \end{matrix}\right\} \gtreqless \left\{\begin{matrix} SG \\ NM \end{matrix}\right\} : GI$

folglich $\left.\begin{matrix} VN : NM \\ p : q \end{matrix}\right\} \gtreqless \left\{\begin{matrix} NG \\ FI \end{matrix}\right\} : GI$

Beweis.

Es ist $\sqrt{GE.EK} = EI$

also $GE.EK + EI^2 = 2EI\sqrt{GE.EK}$

folglich $GE.EK = (2\sqrt{GE.EK} - EI)EI$

mithin $\left.\begin{matrix} IE : EK \\ FI : OK \end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix} GE : 2\sqrt{GE.EK} - EI \\ GE+EI \\ IG \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}-IG$

somit $FI : IG = OK : GE+EK+2\sqrt{GE.EK} - IG$

$= OK+FI : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

Da nun $p : q \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} FI : IG$

so ist $p : q \left\{ \begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix} \right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

also $GS \left\{ \begin{matrix} = \\ > \end{matrix} \right\} GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

folglich berührt (Fig. 43.), oder schneidet (Fig. 44.) der Kreis die Linie TU.

Da ferner $p : q \left\{ \begin{matrix} NM \\ VN \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} FI \\ NG \end{matrix} \right\} : IG$

so ist $\left\{ \begin{matrix} VN : NG \\ OF : FE \\ KI : IE \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} MN \\ GS \end{matrix} \right\} : IG$

also $KI.IG \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} IE.GS \\ (IK-KE)GS \end{matrix} \right\}$

folglich $KI^2 \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} IK(SG-GK) \\ IK.KS \end{matrix} \right\} - KE.GS$

mithin $\frac{1}{4}KS^2 - IK.KS + KI^2 \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} \frac{1}{4}KS^2 - KE.GS \\ \alpha X^2 \end{matrix} \right\}$

somit $\frac{1}{2}KS - \alpha X \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} KI$
KX

Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VII. Fall 4. Bew.)

also $FL : GX = p : q$ (w. z. lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Vermöge lib. I. loc. VII. Fall 4. Zus. 1. (Fig. 43.) ist für eine andere die Linien EH, ES, AB in W, Y, Z schneidende gerade Linie OZ, $EW : GY < VG : GS$

Es ist aber $FZ : EW = FO : OE$
$= NV : VG$

also $FZ : GY < \begin{cases} NV : \begin{cases} GS \\ NM \end{cases} \\ p : q \end{cases}$

also bestimmt der Punkt X, für welchen $EX = \sqrt{KE.EG}$, ein gröfseres Verhältnifs, als jeder andere Punkt der Linie EI.

Da auch, wenn die, die Linien EH, AB, IF in β, δ, γ schneidende gerade Linie $O\gamma$ gezogen wird (verm. desselben Zus.), wenn $\gamma I > IY$, $EW : GY > E\beta : G\gamma$

Es ist aber $FZ : EW = FO : OE$
$= F\delta : E\beta$

also ist $FZ : GY > F\delta : G\gamma$

folglich bestimmen die dem Punkte X näher liegenden Punkte der Linie EI gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man (Fig. 44.) in dem zweiten Durchschnitte R' der Linie TU und des Kreises ein Perpendikel auf TU, welches die Linie IS in X' schneide, so ist, wenn die, die Linien EH, AB in H', L' schneidende gerade Linie OX' gezogen wird,

$EH' : GX' = OK : GS$ (lib. I. loc. VII. Fall 4. Zus. 2.)

also $FL' : GX' = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.)

folglich ist eine Linie gefunden, welche von den Linien FA, GC Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 5. ist.

β) Es sey $EI < \sqrt{GE.EK}$. (Fig. 44.)

Determination.

Da vermöge lib. I. loc. VII. Fall 4. Det.

$GS \gtreqless GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$ werden mufs,

so wird $GS > GE+EK+2EI$

also $\left.\begin{matrix} KS \\ 2K\alpha \end{matrix}\right\} > 2KI$ wenn $K\alpha = \alpha S$,

folglich $K\alpha > KI$.

Damit der Punkt X auf EI falle, mufs also

$KI \gtreqless K\alpha - \alpha X$ seyn.

Nun ist $KX.XS = EK.GS$

also mufs $p : q \gtreqless FI : IG$ seyn (wie zu α.).

Beweis.

Es ist $\sqrt{GE.EK} > EI$

also $GE.EK+EI^2 > 2\sqrt{GE.EK}.EI$ (El. II. 9. 7.)

folglich $GE.EK > (2\sqrt{GE.EK}-EI)EI$

mithin $IE : EK < GE : 2\sqrt{GE.EK}-EI$

somit

$$\left.\begin{matrix} IE : EK \\ FI : OK \end{matrix}\right\} < \left\{\begin{matrix} GE+EI \\ GI \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} EK+2\sqrt{GE.EK}-EI \\ GE+EK+2\sqrt{GE.EK}-IG \end{matrix}\right. \text{(Haub. §. 44.)}$$

demnach $FI : IG < OK : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}-IG$

also $FI : IG < OK+FI : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$ (Haub. §. 44.)

folglich $p : q \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\} < \left\{ \begin{matrix} OK+FI \\ - \\ VN \end{matrix} \right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$
$VN ; \left\{ \begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix} \right\}$

mithin $GS > GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$
also schneidet der Kreis die Linie TU.

Da ferner $p : q \leqq FI : IG$

so ist $KX \leqq KI$ (wie zu α.)

Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VII. Fall 4. Bew.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Macht man $E\varepsilon = \sqrt{GE.EK}$, und zieht die, die Linien EH, IA in μ, λ schneidende gerade Linie $O\varepsilon$, so ist, wenn auch eine die Linien EH, EI, IF in W, Y, Z schneidende gerade Linie OZ gezogen wird,

$EW : GY < E\mu : G\varepsilon$ (lib. I. loc. VII. Fall 4. Zus. 1.)

also $EW : E\mu \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\} < GY : G\varepsilon$
$FZ : F\lambda \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}$

folglich $FZ : GY < F\lambda : G\varepsilon$
mithin bestimmt der Punkt ε ein gröfseres Verhältnifs, als jeder Punkt der Linie EI.

Ferner ist, wenn $X\varepsilon > Y\varepsilon$ (verm. desselben Zus.)

$EH : GX < EW : GY$

also $EH : EW \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\} < GX : GY$
$FL : FZ \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\}$

folglich $FL : GX < FZ : GY$

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie E ε gröſsere Verhältniſse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Buchst., wie α. Zus. 2.

γ.) Es sey $EI > \sqrt{GE.EK}$. (Fig. 44. 45. 46.)

ℵ.) Es sey $p : q < OK+FI : GI+IK$. (Fig. 44.)

Determination.

$$\text{Da } p : q \left.\begin{matrix} \\ VN : \left\{\begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix}\right\} \end{matrix}\right\} < \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix}\right\} : GI+IK$$

so ist $GS > GI+IK$

$$\text{also } \left.\begin{matrix} KS \\ 2K\alpha \end{matrix}\right\} > 2KI \qquad \text{wenn } K\alpha = \alpha S$$

folglich $K\alpha > KI$

Damit der Punkt X auf EI falle, muſs mithin $KI \overset{=}{>} K\alpha - \alpha X$ werden.

Nun ist $KX.XS = EK.GS$

also muſs $p : q \overset{=}{<} FI : IG$ seyn (wie zu α.).

Beweis.

$$\text{Es ist } p : q \left.\begin{matrix} \\ ON : \left\{\begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix}\right\} \end{matrix}\right\} < \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ ON \end{matrix}\right\} : GI+IK \text{ (p. hyp.)}$$

$$\text{also } GS > \left\{\begin{matrix} GI+IK \\ GE+EK+2EI \end{matrix}\right.$$

folglich $GS > GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

mithin schneidet der Kreis die Linie TU.

Ferner ist $p : q \gtreqless FI : IG$

also $KI \gtreqless KX$ (wie zu α.)

Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VII. Fall 4.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zuss. 1. 2.

Buchst., wie β. Zuss. 1. 2., wenn nur ε zwischen E, I genommen wird.

2.) Es sey $p : q = OK+FI : GI+IK$. (Fig. 45. a.)

Beweis.

Es ist $p : q \left\{ \begin{matrix} ON \\ NM \\ GS \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} OK+FI \\ ON \end{matrix} \right\} : GI+IK$

also $GS = GI+IK$
$= GE+EK+2EI$

folglich $GS > GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

mithin schneidet der Kreis die Linie TU.

Ferner ist $SG-GK \left\{ \begin{matrix} KS \\ 2K\alpha \end{matrix} \right\} = 2KI$ wenn $K\alpha = \alpha S$

also $K\alpha = KI$

folglich fällt der Punkt X auf EI.

Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VII. Fall 4.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zuss. 1. 2.

Buchst., wie N. Zuss. 1. 2.

1) Es sey $p:q > OK+FI:GI+IK$. (Fig. 45. b. 46.)

Determination.

Vermöge lib. I. loc. VII. Fall 4. Det. muſs seyn

$$GS \overset{=}{>} GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$$

also $VN : \left\{\begin{matrix} GS \\ NM \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} = \\ < \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} VN \\ OK+FI \end{matrix}\right\} ; GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

$p:q$

Beweis.

Es ist $p:q \left\{\begin{matrix} = \\ < \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

$VN : \left\{\begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix}\right\}$

folglich $GS \overset{=}{>} GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

mithin berührt (Fig. 45. b.), oder schneidet (Fig. 46.) der Kreis die Linie TU.

Ferner ist $p:q \left\{\begin{matrix} > \\ \end{matrix}\right\} OK+FI : GI+IK$

$ON : \left\{\begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix}\right\}$

also $GS < GI+IK$

folglich $KS \left\{\begin{matrix} < 2KI \\ 2K\alpha \end{matrix}\right.$ wenn $K\alpha = \alpha S$

mithin $K\alpha < KI$

Der Punkt X liegt also auf EI.

Auch ist $EH : GX = OK : GS$

also $FL : GX = p : q$

Zus. 1.

Buchst., wie α. Zus. 1., wenn Fig. 45. b. statt Fig. 43. gesetzt wird.

Zus. 2.

Errichtet man (Fig. 46.) in dem zweiten Durchschnitte R′ des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie EI in einem Punkte X′ zwischen E, I, oder in I, oder zwischen I, C, je nachdem $KI \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} K\alpha + \alpha X'$,

oder, da $KX'.X'S = EK.GS$

also $\alpha X = \sqrt{\tfrac{1}{4}KS^2 - EK.GS}$

je nachdem $KI \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} \tfrac{1}{2}KS + \sqrt{\tfrac{1}{4}KS^2 - EK.GS}$

also $KI^2 - IK.KS + \tfrac{1}{4}KS^2 \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} \tfrac{1}{4}KS^2 - EK.GS$

folglich $KI^2 \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix}IK.KS\\IK(SG\ GK)\\IE.GS - IK.KG\end{matrix}\right\} - EK.GS$

mithin $KI(IK+KG) \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} IE.GS$

$KI.IG$

somit $KI : IE \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix}SG\\MN\end{matrix}\right\} : GI$

$OF : FE$

$VN : NG$

demnach $VN : NM \left\{\begin{matrix} > \\ = \\ < \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} NG : GI \\ FI : IG \end{matrix}\right\}$
$p : q$

Auch ist $EH' : GX' = OK : GS$ (lib. I. loc. VII. Fall 4. Zus. 1.)

also $FL' : GX' = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.)

Fall 5.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien F A, G C. (Fig. 43. 47—49.)

Analysis. Construction.

Buchst., wie zu Fall 4.

α.) Es sey $EI = \sqrt{GE.EK}$. (Fig. 43. 47.)

Determination.

Vermöge lib. I. loc. VII. Fall 4. mufs seyn

$$GS \left\{\begin{matrix} = \\ > \end{matrix}\right\} GE + EK + 2\sqrt{GE.EK}$$

also $VN : \left\{\begin{matrix} GS \\ NM \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} = \\ < \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} VN \\ OK + FI \end{matrix}\right\} : GE + EK + 2\sqrt{GE.EK}$
$p : q$

Beweis.

Es ist $p : q \left\{\begin{matrix} = \\ < \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} OK + FI \\ VN \end{matrix}\right\} : GE + EK + 2\sqrt{GE.EK}$
$VN : \left\{\begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix}\right\}$

folglich $GS \left\{\begin{matrix} = \\ > \end{matrix}\right\} GE + EK + 2\sqrt{GE.EK}$

mithin berührt (Fig. 43.), oder schneidet (Fig. 47.) der Kreis die Linie TU.

Ferner ist $GS \gtreqless GE+EK+2EI$

also $\left.\begin{matrix} GS-GK \\ 2K\alpha \end{matrix}\right\} \gtreqless 2KI$ wenn $K\alpha = \alpha S$

folglich $K\alpha \gtreqless KI$

mithin liegt der Punkt X auf IC.

Auch ist EH : GX = OK : GS (lib. I. loc. VII. Fall 4.)

also FL : GX = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Buchst., wie Fall 4. α. Zus. 1., wenn IS, IA statt EI, IF gesetzt werden.

Zus. 2.

Errichtet man (Fig. 47.) auch in dem zweiten Durchschnitte R' des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie EC zwischen I, C, oder in I, oder zwischen I, E,

je nachdem $KI \left\{\begin{matrix} < \\ = \\ > \end{matrix}\right\} K\alpha - \alpha X'$

oder, da $\left.\begin{matrix} KX'.X'S \\ K\alpha^2 \\ \frac{1}{4}KS^2 \end{matrix}\right\} = \left.\begin{matrix} \\ -\alpha X'^2 \\ \end{matrix}\right\} EK.GS$

also $\sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - EK.GS} = \alpha X'$

je nachdem $KI \left\{\begin{matrix} < \\ = \\ > \end{matrix}\right\} \frac{1}{2}KS - \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - EK.GS}$

also $KI^2 - IK.KS + \frac{1}{4}KS^2 \left\{\begin{matrix} < \\ = \\ > \end{matrix}\right\} \frac{1}{4}KS^2 - EK.GS$

$$\text{folglich } KI^2 \left\{\begin{matrix}<\\=\\>\end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} IK.KS \\ IK(SG-GK) \\ IE.GS-IK.KG \end{matrix}\right\} -EK.GS$$

$$\text{mithin } KI.IG \left\{\begin{matrix}<\\=\\>\end{matrix}\right\} IE.GS$$

$$\text{somit } \left.\begin{matrix} KI:IE \\ OF:FE \\ VN:NG \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix}<\\=\\>\end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} SG \\ MN \end{matrix}\right\} : GI$$

$$\text{demnach } \left.\begin{matrix} VN:NM \\ p:q \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix}<\\=\\>\end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} NG:GI \\ FI:IG \end{matrix}\right.$$

Auch ist $EH' : GX' = OK : GS$ (lib. I. loc. VII. Fall 4.)

also $FL' : GX' = p:q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 4. Bew.)

β.) Es sey $EI < \sqrt{GE.EK}$ (Fig. 49. 47.)

Determination.

Buchstäblich, wie zu α.

Beweis.

$$\text{Es ist } p:q \left.\begin{matrix} \\ VN: \left\{\begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix}\right. \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix}=\\<\end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$$

$$\text{folglich } GS \left\{\begin{matrix}=\\>\end{matrix}\right\} GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$$

mithin berührt (Fig. 49.), oder schneidet (Fig. 47.) der Kreis die Linie TU.

Ferner ist $GS > GE+EK+2EI$

also $\left.\begin{matrix} KS \\ 2K\alpha \end{matrix}\right\} > 2KI$ wenn $K\alpha = \alpha S$

folglich $K\alpha > KI$

mithin liegt X auf IC.

Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VII. Fall 4.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I, Fall 1. Bew.)

Zuss. 1. 2.

Buchst., wie α. Zuss. 1. 2.

γ) Es sey $EI > \sqrt{GE.EK}$. (Fig. 47. 48.)

$\aleph$.) Es sey $p : q < OK+FI : GI+IK$. (Fig. 47.)

Beweis.

Es ist $EI > \sqrt{GE.EK}$

also $\left.\begin{matrix} GE+EK+2EI \\ GI+IK \end{matrix}\right\} > GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

folglich

$$OK+FI : GI+IK < \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$$

mithin $p : q \left.\begin{matrix} \\ VN : \left\{\begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix}\right. \end{matrix}\right\} < VN : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

somit $GS > GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

demnach schneidet der Kreis die Linie TU.

Da ferner $p : q \left\{ < \begin{matrix} VN : GI+IK \\ VN : GS \end{matrix} \right.$

so ist $GS > GI+IK$

also $KS \left\{ > \begin{matrix} 2KI \\ 2K\alpha \end{matrix} \right.$ wenn $K\alpha = \alpha S$

folglich $K\alpha > KI$

mithin liegt der Punkt X auf IC.

Auch ist EH : GX = OK : GS (lib. I. loc. VII. Fall 4.)

also FL : GX = p:q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Macht man $E\varepsilon = \sqrt{GE.EK}$, und zieht Os, welche die Linien EH, IF in μ, λ schneide, so ist, wenn auch die, die Linien EH, IA, IS in W, Z, Y schneidende gerade Linie OY gezogen wird, (verm. lib. I. loc. VII. Fall 4. Zus. 1.) $EW : GY < E\mu : E\varepsilon$, also bestimmt (wie Fall 4. β. Zus. 1.) der Punkt ε ein gröfseres Verhältnifs, als jeder Punkt der Linie IS. Auch ist, wenn $X\varepsilon > Y\varepsilon$, $FL : GX < FZ : GY$ (vermöge desselben Zus.), also bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie IS gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Buchst., wie α. Zus. 2.

3.) Es sey $p:q = OK+FI:GI+IK$. (Fig. 48. a.)

Beweis.

Es ist $EI > \sqrt{GE.EK}$

also $GS > GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$, (wie 8. Bew.)
folglich schneidet der Kreis die Linie TU.

Da ferner $p : q \left\} = \left\{ \begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix} \right\} \right\} : \left\{ \begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix} \right\} = GI+IK$

so ist $GS = GI+IK$

also $KS \left\} = 2KI$
$2K\alpha \left\}$ wenn $K\alpha = \alpha S$

folglich $K\alpha = KI$
mithin liegt der Punkt X auf IC.
Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VII. Fall 4.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Buchst., wie 8. Zus. 1.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie EI in X' so, dafs $EH' : GX' = OK : GS$ (lib. I. loc. VII. Fall 4. Zus. 2.)

also $FL' : GX' = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.), welches Fall 4. ist.

3.) Es sey $p : q > OK+FI : GI+IK$. (Fig. 48. b.)

Determination.

Da $p : q \left\} > \left\{ \begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix} \right\} \right\} : \left\{ \begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix} \right\}$ VN

so wird $GS < GI + IK$

folglich $\left.\begin{matrix} KS \\ 2K\alpha \end{matrix}\right\} < 2KI$ wenn $K\alpha = \alpha S$

mithin $K\alpha < KI$

Damit der Punkt X auf IC falle, mufs also $KI \lessgtr K\alpha + \alpha X$ seyn.

Nun ist $KX.XS = EK.GS$

also $\alpha X = \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - EK.GS}$

folglich mufs seyn $KI \lessgtr \frac{1}{2}KS + \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - EK.GS}$

mithin $KI^2 - IK.KS + \frac{1}{4}KS^2 \lessgtr \frac{1}{4}KS^2 - EK.GS$

somit $KI^2 \lessgtr \left\{\begin{matrix} IK.KS \\ IK(SG-GK) \\ IE.GS - IK.KG \end{matrix}\right\} - EK.GS$

demnach $\left.\begin{matrix} KI(IK+KG) \\ KI.IG \end{matrix}\right\} \lessgtr IE.GS$

also $\left.\begin{matrix} KI : IE \\ OF : FE \\ VN : NG \end{matrix}\right\} \lessgtr \left\{\begin{matrix} SG \\ MN \end{matrix}\right\} : GI$

folglich $\left.\begin{matrix} VN : NM \\ p : q \end{matrix}\right\} \lessgtr \left\{\begin{matrix} NG : GI \\ FI : IG \end{matrix}\right.$

Beweis.

Es ist $\sqrt{GE.EK} < EI$

also $GE.EK + EI^2 > 2EI\sqrt{GE.EK}$ (El. II. 9. 5.)

folglich $GE.EK > EI(2\sqrt{GE.EK} - EI)$

mithin $IE : EK < GE : 2\sqrt{GE.EK} - EI$

somit $\left.\begin{matrix} IE : EK \\ FI : OK \end{matrix}\right\} < \left\{\begin{matrix} GE+EI : EK+2\sqrt{GE.EK}-EI \\ GI \quad : GE+EK+2\sqrt{GE\,EK}\,.\,IG \end{matrix}\right.$

demnach $FI : IG < OK : GE+EK+2\sqrt{GE.EK} - IG$

also $FI : IG < OK+FI : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

folglich $\left.\begin{matrix} p : q \\ VN : \left\{\begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix}\right. \end{matrix}\right\} < \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

mithin $GS > GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

Der Kreis schneidet also die Linie T U.

Ferner ist $\left.\begin{matrix} p : q \\ VN : NM \end{matrix}\right\} \overset{=}{<} \left\{\begin{matrix} FI \\ NG \end{matrix}\right\} : IG$

also $\left.\begin{matrix} VN : NG \\ OF : FE \\ KI : IE \end{matrix}\right\} \overset{=}{<} \left\{\begin{matrix} MN \\ SG \end{matrix}\right\} : GI$

folglich $\left.\begin{matrix} KI.IG \\ KI(IK+KG) \end{matrix}\right\} \overset{=}{<} \left\{\begin{matrix} IE.SG \\ (IK-KE)GS \end{matrix}\right.$

mithin $KI^2 \overset{=}{<} \left\{\begin{matrix} IK(SG-GK) \\ IK.KS \end{matrix}\right\} - KE.GS$

somit $KI^2 - IK.KS + \frac{1}{4}KS^2 \overset{=}{<} \frac{1}{4}KS^2 - KE.GS$

demnach $KI \lessgtr \left\{ \begin{matrix} \frac{1}{2}KS + \\ KX \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - KE.GS} \\ \alpha X \end{matrix} \right.$

also liegt X′ auf IS.

Auch ist EH : GX = OK : GS (lib. I. loc. VII. Fall 4.)

also FL : GX = p:q (wie zu lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Buchst., wie א. Zus. 1.

Zus. 2.

Buchst., wie ב. Zus. 2.

C.) auf IK. (Fig. 50 — 69.) Bezeichnet man den Durchschnitt der Linien OF, CD mit E, so liege der Punkt G

a.) auf der Linie KE. (Fig. 50 — 60.) (Loc. IV.)

Fall 1.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien F A, G D. (Fig. 50.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VI. Fall 1. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Beweis.

Es ist EH : GX = OK : GS (lib. I. loc. VI. Fall 1. Bew.)

also FL : GX = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien EH, FA, SD in W, Z, Y schneidende gerade Linie OY ist

$$EW : GY \lessgtr VG : GS$$

also $FZ : GY \lessgtr p : q$

folglich bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie SD gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' der Linie TU, und des Kreises ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie GE in einem Punkte X' so, dafs, wenn die, die Linien EH, FB in den Punkten H', L' schneidende gerade Linie OX' gezogen wird,

$EH' : GX' = OK : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 1. Zus. 1.)

also $FL' : GX' = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

folglich ist eine Linie OX' gefunden, welche von den Linien FB, GI Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 3. ist.

Fall 2.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien GK, FB. (Fig. 51. 52.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VI. Fall 2. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Determination.

Damit der Kreis die Linie TU erreiche, mufs seyn

$GS \leqq GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$ (lib. I. loc. VI. Fall 2. Det.)

---

also $VN : \left\{\begin{matrix} GS \\ NM \end{matrix}\right\} \geqq \left\{\begin{matrix} VN \\ OK+FI \end{matrix}\right\} : GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$

$p : q$

Beweis.

Es ist $p : q \left\{\begin{matrix} = \\ > \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix}\right\} : GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$ (Det.)

$VN : \left\{\begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix}\right\}$

---

folglich $GS \leqq GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$

mithin berührt (Fig. 51.), oder schneidet (Fig. 52.) der Kreis die Linie TU, so dafs

$EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 2. Bew.)

---

also ist $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, in Fig. 51. die Linien KG, EH, FB in Y, W, Z schneidende gerade Linie OZ ist

$EW : GY > VG : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 2. Zus. 1.)

Es ist aber $FZ : EW = FO : OE$

$= NV : VG$

---

also ist $FZ : GY > \left\{\begin{matrix} VN : \left\{\begin{matrix} GS \\ MN \end{matrix}\right. \\ p : q \end{matrix}\right.$

folglich bestimmt der Punkt X, für welchen $EX = \sqrt{GE.EK}$ ein kleineres Verhältniſs, als jeder andere Punkt der Linie KS.

Auch ist für eine die Linien KG, EH, FB in γ, β, δ schneidende gerade Linie $O\delta$, wenn $\gamma X > XY$,

$E\beta : G\gamma > EW : GY$ (lib. I. loc. VI. Fall 2. Zus. 1.)

Es ist aber $F\delta : E\beta = FO : OE$
$= FZ : EW$

also ist $F\delta : G\gamma > FZ : GY$

mithin bestimmen die dem Punkte X näher liegenden Punkte der Linie KG kleinere Verhältniſse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in Fig. 52. in dem zweiten Durchschnitte R' der Linie TU und des Kreises ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie KS in X' so, daſs, wenn die, die Linien EH, FB in H', L' schneidende gerade Linie OL' gezogen wird,

$EH' : GX' = OK' : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 2. Zus. 2.)

also $FL' : GX' = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

folglich ist eine zweite Linie OX' gefunden, welche von den Linien GK, FB Segmente in dem gegebenen Verhältniſse abschneidet.

Fall 3.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FB, GC. (Fig. 50.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., wenn man daselbst X', H', L' statt X, H, L setzt, also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VI. Fall 3. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Determination.

Damit der Kreis die Linie TU erreiche, mufs seyn

$GS \leqq GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$ (lib. I. loc. VI. Fall 2. Det.)

---

also $VN : \left\{\begin{matrix} GS \\ NM \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} = \\ > \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} VN \\ OK+FI \end{matrix}\right\} : GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$

$p : q$

Beweis.

Es ist $p : q \left\{\begin{matrix} = \\ > \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix}\right\} : GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$ (Det.)

$VN : \left\{\begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix}\right\}$

---

folglich $GS \leqq GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$

mithin berührt (Fig. 51.), oder schneidet (Fig. 52.) der Kreis die Linie TU, so dafs

$EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 2. Beww.)

---

also ist $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, in Fig. 51. die Linien KG, EH, FB in Y, W, Z schneidende gerade Linie OZ ist

$EW : GY > VG : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 2. Zus. 1.)

Es ist aber $FZ : EW = FO : OE$

$= NV : VG$

---

also ist $FZ : GY > \left\{\begin{matrix} VN : \left\{\begin{matrix} GS \\ MN \end{matrix}\right. \\ p : q \end{matrix}\right.$

folglich bestimmt der Punkt X, für welchen $EX = \sqrt{GE.EK}$ ein kleineres Verhältnifs, als jeder andere Punkt der Linie KS.

Auch ist für eine die Linien KG, EH, FB in γ, β, δ schneidende gerade Linie Oδ, wenn $\gamma X > XY$,

$E\beta : G\gamma > EW : GY$ (lib. I. loc. VI. Fall 2. Zus. 1.)

Es ist aber $F\delta : E\beta = FO : OE$
$= FZ : EW$

also ist $F\delta : G\gamma > FZ : GY$

mithin bestimmen die dem Punkte X näher liegenden Punkte der Linie KG kleinere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in Fig. 52. in dem zweiten Durchschnitte R′ der Linie TU und des Kreises ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie KS in X′ so, dafs, wenn die, die Linien EH, FB in H′, L′ schneidende gerade Linie OL′ gezogen wird,

$EH' : GX' = OK : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 2. Zus. 2.)

also $FL' : GX' = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.) folglich ist eine zweite Linie OX′ gefunden, welche von den Linien GK, FB Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet.

Fall 3.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FB, GC. (Fig. 50.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., wenn man daselbst X′, H′, L′ statt X, H, L setzt, also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VI. Fall 3. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., wenn daselbst R', X', H', L' statt R, X, H, L gesetzt wird.

Beweis.

Es ist EH' : GX' = OK : GS (lib. I. loc. VI. Fall 3. Bew.)

also FL' : GX' = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien EG, EH, FB in Y', W', Z' schneidende gerade Linie OZ' ist

$$EW' : GY' \lesseqgtr VG : GS$$ (lib. I. loc. VI. Fall 3. Zus. 1.)

Es ist aber FZ' : EW' = FO : OE
= VN : VG

also ist $$FZ' : GY' \lesseqgtr \begin{cases} VN : \begin{cases} GS \\ MN \end{cases} \\ p : q \end{cases}$$

folglich bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie GE kleinere Verhältnisse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie KD in X so, dafs, wenn die, die Linien EH, FA in H, L schneidende gerade Linie OX gezogen wird,

EH : GX = OK : GS (lib. I. loc. VI. Fall 3. Zus. 2.)

also FL : GX = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

mithin ist auch eine Linie OX gefunden, welche von den Linien FA, GD Segmente in dem gegebenen Verhältnisse abschneidet, welches Fall 1. ist.

Fall 4.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FI, IE. (Fig. 53–57.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VI. Fall 4. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

α.) Es sey $EI=\sqrt{KE.EG}$. (Fig. 53. 54.)

Determination.

Da $GS \gtreqless GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$ (lib. I. loc. VI. Fall 4. Det.) werden mufs, so wird $GS \gtreqless GE+EK+2EI$

also $\left.\begin{matrix} KS \\ 2K\alpha \end{matrix}\right\} \gtreqless 2KI$ wenn $K\alpha=\alpha S$

folglich $K\alpha \gtreqless KI$

Damit der Punkt X auf EI falle, mufs also $KI \gtreqless K\alpha-\alpha X$ werden.

Nun ist $\left.\begin{matrix} KX.XS \\ K\alpha^2 \\ -\alpha X^2 \\ \frac{1}{4}KS^2 \end{matrix}\right\} = EK.GS$

also $\alpha X=\sqrt{\frac{1}{4}KS^2-EK.GS}$

folglich mufs seyn $KI \gtreqless \frac{1}{2}KS - \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - EK.GS}$

mithin $\frac{1}{4}KS^2 - EK.GS \gtreqless \frac{1}{4}KS^2 - IK.KS + KI^2$

somit $\left.\begin{matrix} IK.KS \\ IK(KG+GS) \\ (IK-KE)GS \\ IE.GS \end{matrix}\right\} \left.\begin{matrix} -EK.GS \\ \\ +IK.KG \\ \\ \end{matrix}\right\} \gtreqless KI^2$

demnach $IE.GS \gtreqless \left\{\begin{matrix} KI(IK-KG) \\ KI.IG \end{matrix}\right.$

also $\left.\begin{matrix} KI : IE \\ OF : FE \\ VN : NG \end{matrix}\right\} \lesseqgtr \left\{\begin{matrix} SG \\ NM \end{matrix}\right\} : GI$

folglich $\left.\begin{matrix} VN : NM \\ p : q \end{matrix}\right\} \lesseqgtr \left\{\begin{matrix} NG \\ FI \end{matrix}\right\} : IG$

Beweis.

Es ist $EI = \sqrt{GE.EK}$

also $GE.EK + EI^2 = 2EI\sqrt{GE.EK}$

folglich $GE.EK = (2\sqrt{GE.EK} - EI)IE$

mithin $\left.\begin{matrix} IE : EK \\ FI : OK \end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix} GE : 2\sqrt{GE.EK} - EI \\ GE+EI \\ GI \end{matrix}\right\} : GE + EK + 2\sqrt{GE.EK} \cdot IG$

somit $FI : IG = OK : GE + EK + 2\sqrt{GE.EK} - IG$

$= \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix}\right\} : GE + EK + 2\sqrt{GE.EK}$

demnach $p : q \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} VN : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

$VN : \left\{ \begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix} \right\}$

folglich $GS \left\{ \begin{matrix} = \\ > \end{matrix} \right\} GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

mithin berührt (Fig. 53.), oder schneidet (Fig. 54.) der Kreis die Linie TU.

Da ferner $p : q \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} FI \\ NG \end{matrix} \right\} : IG$

$VN : NM$

so ist $\left.\begin{matrix} VN : NG \\ OF : FE \\ KI : IE \end{matrix}\right\} \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} NM \\ SG \end{matrix} \right\} : GI$

also $KI.IG \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} IE.SG$

$KI(IK-KG)$

folglich $KI^2 \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} IE.SG \\ (IK-KE)SG \\ IK(SG+GK) \\ IK.KS \end{matrix} \right\} \begin{matrix} +IK.KG \\ \\ -KE.SG \\ \\ \end{matrix}$

mithin $\frac{1}{4}KS^2-IK.KS+KI^2 \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} \frac{1}{4}KS^2-KE.SG$

somit $\frac{1}{2}KS-KI \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} \sqrt{\frac{1}{4}KS^2-KE.SG}$

αX

demnach $\left.\begin{matrix} \frac{1}{2}KS-\alpha X \\ KX \end{matrix}\right\} \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} KI$

Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 4. Bew.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, in Fig. 53. die Linien EI, EH, FI in Y, W, Z schneidende gerade Linie OZ ist

$$EW : GY < \begin{cases} EH : GX \\ OK : GS \end{cases} \text{ (lib. I. loc. VI. Fall 4. Zus. 1.)}$$

Es ist aber $FZ : EW = FO : OE$
$= NV : VG$

also ist $FZ : GY < \begin{cases} NV : \begin{cases} GS \\ MN \end{cases} \\ p : q \end{cases}$

mithin bestimmt der Punkt X, ein gröfseres Verhältnifs, als jeder andere Punkt der Linie EI.

Ferner ist für eine andere, die Linien EH, EI, FI in β, γ, δ schneidende gerade Linie $O\delta$, wenn $\gamma X > XY$,

$$EW : GY > E\beta : G\gamma$$

Es ist aber $FZ : EW = FO : OE$
$= F\delta : E\beta$

also ist $FZ : GY > F\delta : G\gamma$

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie EI gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in Fig. 54. in dem zweiten Durchschnitte R' des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie IC so, dafs, wenn die, die Linien EH, IA in H', L' schneidende gerade Linie OX' gezogen wird,

$EH' : GX' = OK : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 4. Zus. 2.)

also $FL' : GX' = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.)

Es ist mithin eine Linie OX' gefunden, welche von den Linien FA, GC Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 5. ist.

β.) Es sey $EI<\sqrt{GE.EK}$. (Fig. 54.)

Determination.

Da $GS\overset{=}{>}GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$ (lib. I. loc. VI. Fall 4. Det.) werden mufs, so wird $GS\overset{=}{>}GE+EK+2EI$

also $KS\overset{=}{>}\begin{cases}2(KE+EI)\\2KI\end{cases}$

folglich $K\alpha\overset{=}{>}KI$ wenn $K\alpha=\alpha S$

mithin mufs $KI\overset{=}{>}K\alpha-\alpha X$ seyn.

Nun ist $KX.XS=EK.GS$

also $p:q\overset{=}{<}FI:IG$ (wie zu α.)

Beweis.

Es ist $EI<\sqrt{GE.EK}$

mithin $GE.EK+EI^2>2EI\sqrt{GE.EK}$

somit $GE.EK>(2\sqrt{GE.EK}-EI)EI$

also $IE:EK<GE:2\sqrt{GE.EK}-\begin{cases}EI\\IG-GE\end{cases}$

folglich $\left.\begin{matrix} IE:EK \\ FI:OK \end{matrix}\right\} < \left\{\begin{matrix} GE+EI \\ IG \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}-IG$

mithin $FI : IG < OK : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}-IG$

somit $FI : IG < OK+FI : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

demnach $\left.\begin{matrix} p:q \\ VN : \left\{\begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix}\right\} \end{matrix}\right\} < \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

also $GS > GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

mithin schneidet der Kreis die Linie T U.

Da ferner $p : q \lessgtr FI : IG$ (Det.)

so ist $KX \lessgtr KI$ (wie zu α.)

Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 4. Bew.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Macht man $E\varepsilon = \sqrt{GE.EK}$, so bestimmt (lib. I. loc. VI. Fall 4, Zus. 1.) der Punkt ε ein gröfseres Verhältnifs, als jeder Punkt der Linie E I, und jeder dem Punkte ε näher liegende Punkt derselben ein gröfseres Verhältnifs, als der entferntere, welches bewiesen wird, wie lib. II. loc. III. Fall 4. β. Zus. 1.

Zus. 2.

Buchst., wie α. Zus. 2.

γ.) Es sey $EI > \sqrt{GE.EK}$. (Fig. 54. 55.)

κ.) Es sey $p:q < OK+FI : GI+IK$. (Fig. 54.)

Determination.

$$\text{Da } p:q \left\} < \left\{ \begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix} \right\} : GI+IK \right.$$
$$VN : \left\{ \begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix} \right\}$$

also $GS > GI+IK$

folglich $GS+GK \left\} > 2KI$
$2K\alpha \left\}$ wenn $K\alpha \doteq \alpha S$

mithin $K\alpha > KI$

Damit der Punkt X auf EI falle, mufs also seyn

$$KI \overset{=}{>} K\alpha - \alpha X$$

folglich $p:q \overset{=}{<} FI : IG$ (wie zu α.).

Beweis.

$$\text{Es ist } p:q \left\} < \left\{ \begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix} \right\} : GI+IK \right.$$
$$VN : \left\{ \begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix} \right\}$$

also $GS > \left\{ \begin{matrix} GI+IK \\ KE+EG+2EI \end{matrix} \right.$

folglich $GS > KE+EG+2\sqrt{GE.EK}$

mithin schneidet der Kreis die Linie TU.

Ferner ist $p:q \overset{=}{<} FI : IG$ (Det.)

also $KI \overset{=}{>} \left\{ \begin{matrix} K\alpha - \alpha X \\ KX \end{matrix} \right.$

Auch ist EH : GX = OK : GS (lib. I. loc. VI. Fall 4. Bew.)

also FL : GX = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zuss. 1. 2.

Buchst., wie β. Zuss. 1. 2.

3.) Es sey $p : q = OK+FI : GI+IK$. (Fig. 55.)

Beweis.

Da $p : q \left\} = \left\{ \begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix} \right\} : GI+IK$

$VN : \left\{ \begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix} \right\}$

so ist $GS = \left\{ \begin{matrix} GI+IK \\ KE+EG+2EI \end{matrix} \right.$

folglich $GS > KE+EG+2\sqrt{KE.EG}$

mithin schneidet der Kreis die Linie TU.

Ferner ist $SG+GK \left\} = 2KI$

$2K\alpha \left\}\right.$. wenn $K\alpha = \alpha S$

also $K\alpha = KI$

demnach liegt der Punkt X auf EI.

Auch ist EH : GX = OK : GS (lib. I. loc. VI. Fall 4. Bew.)

also FL : GX = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zuss. 1. 2.

Buchst., wie β. Zuss. 1. 2.

4.) Es sey $p : q > OK+FI : GI+IK$. (Fig. 56. 57.)

Determination.

Vermöge lib. I. loc. VI. Fall 4. Det. muſs

$GS \overset{=}{>} GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$ seyn

also $VN : \left\{\begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} = \\ < \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} VN \\ OK+FI \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

$p : q$

Beweis.

Es ist $p : q \left\{\begin{matrix} = \\ < \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

$VN : GS \left\{\begin{matrix} < \\ \end{matrix}\right\}$

folglich $GS \left\{\begin{matrix} = \\ > \end{matrix}\right\} GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

mithin berührt (Fig. 56.), oder schneidet (Fig. 57.) der Kreis die Linie TU.

Da ferner $p : q \left\{\begin{matrix} > \\ \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix}\right\} : GI+IK$

$VN : GS \left\{\begin{matrix} \\ \end{matrix}\right\}$

so ist $GS < GI+IK$

also $GS+GK \left\{\begin{matrix} \\ 2K\alpha \end{matrix}\right\} < 2KI$ wenn $K\alpha = \alpha S$

folglich $K\alpha < KI$

mithin liegt der Punkt X auf der Linie EI.

Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 4. Bew.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Vermöge lib. I. loc. VI. Fall 4. Zus. 1. bestimmt in (Fig. 56.) der Punkt α, für welchen $E\alpha = \sqrt{GE.EK}$, ein gröfseres Verhältnifs, als jeder andere Punkt der Linie EI, und jeder demselben näher liegende ein gröfseres, als der entferntere, welches bewiesen wird, wie lib. II. loc. III. Fall 4. α. Zus. 1.

Zus. 2.

Errichtet man (Fig. 57.) in dem zweiten Durchschnitte R' des Kreises und der Linie TU ein Per-

pendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie EC in einem Punkte X′ zwischen E, I, oder in I, oder zwischen I, C,

$$\text{je nachdem } KI \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} \begin{cases} K\alpha+\alpha X' \\ \frac{1}{2}KS+\sqrt{\frac{1}{4}KS^2-EK.GS} \end{cases}$$

$$\text{also } KI^2-IK.KS+\tfrac{1}{4}KS^2 \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} \tfrac{1}{4}KS^2-EK.GS$$

$$\text{folglich } KI^2 \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} \begin{cases} IK.KS \\ IK(KG+GS) \\ IK.KG+IE.GS \end{cases} -EK.GS$$

$$\text{mithin } KI(IK-KG) \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} IE.GS$$
$$KI.IG$$

$$\text{somit } \begin{matrix} KI \\ OF \\ VN \end{matrix} : \begin{matrix} IE \\ FE \\ \begin{cases} NG \\ FI \end{cases} \end{matrix} \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} \begin{cases} SG \\ MN \end{cases} : GI$$

$$\text{demnach } VN : NM \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} FI : IG$$
$$p : q$$

Auch ist EH′ : GX′ = OK : GS (lib. I. loc. VI. Fall 4. Zus. 2.)

also FL′ : GX′ = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.)

Fall 5.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, GC. (Fig. 53. 58—60.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VI. Fall 4. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

α.) Es sey $EI=\sqrt{GE.EK}$ (Fig. 53. 58.)

Determination.

Es muſs seyn $GS \gtreqless GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$ (lib. I. loc. VI. Fall 4. Det.)

also $VN : \left\{\begin{matrix} GS \\ MN \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} = \\ < \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} VN \\ OK+FI \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

$p : q$

Beweis.

Es ist $p : q \left\{\begin{matrix} = \\ < \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

$VN : \left\{\begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix}\right\}$

folglich $GS \gtreqless GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

mithin berührt (Fig. 53.), oder schneidet (Fig. 58.) der Kreis die Linie TU.

Ueberdiefs da $GS \gtreqless GE+EK+2EI$

ist $KS \gtreqless \left\{\begin{matrix} 2(KE+EI) \\ 2KI \end{matrix}\right\}$

folglich $K\alpha \gtreqless KI$, wenn $K\alpha=\alpha S$

folglich liegt der Punkt X auf IC.

Auch ist EH : GX=OK:GS (lib. I. loc. VI. Fall 4. Bew.)

also FL : GX=p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Vermöge lib. I. loc. VI. Fall 4. bestimmt in Fig. 53. der Punkt α, für welchen $E\alpha=\sqrt{KE.EG}$, ein gröfseres Verhältnifs, als jeder andere Punkt der Linie IS, und jeder dem Punkte I näher liegende derselben ein gröfseres, als der entferntere, welches bewiesen wird, wie lib. II. loc. IV. Fall 4. α. Zus. 1.

Zus. 2.

Der durch den anderen Durchschnitt R′ in Fig. 58. bestimmte Punkt X′ fällt zwischen E, I, oder in I, also zwischen I, C,

$$\text{je nachdem } KI \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} KX'$$

$$\text{das heifst, da } \left.\begin{matrix}KX.XS\\ K\alpha^2\\ \frac{1}{4}KS^2\end{matrix}\right\} = EK.GS \left\{\begin{matrix}\\ -\alpha X^2\\ \end{matrix}\right\}$$

$$\text{also } \alpha X=\sqrt{\tfrac{1}{4}KS^2-EK.GS}$$

$$\text{je nachdem } KI \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} \tfrac{1}{2}KS-\sqrt{\tfrac{1}{4}KS^2-EK.GS}$$

$$\text{mithin } \tfrac{1}{4}KS^2-EK.GS \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} \tfrac{1}{4}KS^2-IK.KS+KI^2$$

$$\text{somit } \left.\begin{matrix}IK.KS\\ IK(KG+GS)\\ (IK-KE)GS\\ IE.GS\end{matrix}\right\} -EK.GS \left\{\begin{matrix}\\ \\ \\ +IK.KG\end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} KI^2$$

demnach $IE.GS \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix}KI(IK-KG)\\KI.IG\end{matrix}\right.$

---

also $\left.\begin{matrix}KI:IE\\OF:FE\\VN:\left\{\begin{matrix}NG\\FI\end{matrix}\right.\end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix}SG\\MN\end{matrix}\right\} : GI$

---

folglich $VN:NM \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} FI:IG$
$p:q$

Auch ist, wenn die, die Linien EH, IA in H', L' schneidende gerade Linie OX' gezogen wird,

$EH' : GX' = OK : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 4. Zus. 2.)

---

also $FI' : GX' = p:q$ (wie zu lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

β.) Es sey $EI < \sqrt{GE.EK}$. (Fig. 59. a. 58.)

Determination.

Buchstäblich, wie zu α.

Beweis.

Es ist $p:q \left\{\begin{matrix}=\\<\end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix}OK+FI\\VN\end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$ (Det.)
$VN:\left\{\begin{matrix}NM\\GS\end{matrix}\right\}$

---

folglich $GS \left\{\begin{matrix}=\\>\end{matrix}\right\} GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

mithin berührt (Fig. 59. a.), oder schneidet (Fig. 58.) der Kreis die Linie TU.

Da $GS \geq GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$ (Det.), $EI < \sqrt{GE.EK}$ (hyp.)

so ist $GS > GE+EK+2EI$

also $KS > 2(KE+EI)$

folglich $K\alpha > KI$ wenn $K\alpha = \alpha S$

mithin liegt der Punkt X auf IC.

Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 4.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

In Beziehung auf Fig. 59. a. buchst., wie α. Zus. 1.

Zus. 2.

In Beziehung auf Fig. 58. buchst., wie α. Zus. 2.

γ.) Es sey $EI > \sqrt{GE.EK}$. (Fig. 58. 60.)

N.) Es sey $p : q < OK+FI : GI+IK$. (Fig. 58.)

Beweis.

Es ist $p : q < OK+FI : GI+IK$

Da $EI > \sqrt{GE.EK}$

so ist $\left.\begin{matrix} GE+EK+2EI \\ GI+IK \end{matrix}\right\} > GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

also $OK+FI : GI+IK < OK+FI : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

folglich $\left.\begin{matrix} p : q \\ VN : \left\{\begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix}\right. \end{matrix}\right\} < \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

mithin $GS > GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

demnach schneidet der Kreis die Linie TU.

Ferner ist $VN : NM \left\{ \begin{matrix} < OK+FI : GI+IK \\ OK+FI : GS \end{matrix} \right.$

also $GS > GI+IK$

folglich $KS > 2KI$

mithin $K\alpha > KI$ wenn $K\alpha = \alpha S$

demnach liegt der Punkt X auf IC.

Auch ist EH : GX = OK : GS (lib. I. loc. VI. Fall 4. Bew.)

also FL : GX = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Macht man $E\varepsilon = \sqrt{GE.EK}$, so bestimmt (lib. I. loc. VI. Fall 4. Zus. 1) der Punkt ε ein gröfseres Verhältnifs, als jeder Punkt der Linie IS, und jeder dem Punkte ε näher liegende Punkt derselben ein gröfseres, als der entferntere, welches bewiesen wird, wie lib. II. loc. III. Fall 4. β. Zus. 1.

Zus. 2.

Buchst., wie α. Zus. 2.

3.) Es sey p : q = OK+FI : GI+IK. (Fig. 59. b.)

Beweis.

Es ist p : q = OK+FI : GI+IK

Da $EI > \sqrt{GE.EK}$

so ist $GS > GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$ (wie 1. Bew.)

also schneidet der Kreis die Linie TU.

Ferner ist $VN : NM \left\{ \begin{matrix} = OK+FI : GI+IK \\ OK+FI : GS \end{matrix} \right.$

also $GS = GI + IK$

folglich $KS = 2KI$

mithin $K\alpha = KI$ wenn $K\alpha = \alpha S$

demnach liegt der Punkt X auf IS.

Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 4. Bew.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Buchst., wie 8. Zus. 1.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, so ist, wenn die, die Linien EH, FI in H', L' schneidende gerade Linie OL' gezogen wird,

$EH' : GX' = VG : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 4. Zus. 2.)

also $FL' : GX' = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.), welches Fall 4. ist.

2.) Es sey $p : q > OK + FI : GI + IK$. (Fig. 60.)

Determination.

Da $p : q$, $VN : NM$, $OK + FI : GS$ $\Big\} > OK + FI : GI + IK$

also $GS < GI + IK$

folglich $KS < 2KI$

mithin $K\alpha < KI$ wenn $K\alpha = \alpha S$

so mufs $KI \lessgtr K\alpha + \alpha X$ seyn.

Nun ist $KX.XS \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right. = EK.GS$
$K\alpha^2 \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right. - \alpha X^2 \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right.$
$\frac{1}{4}KS^2 \left\{ \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right.$

also $\alpha X = \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - EK.GS}$

folglich muſs seyn $KI \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right. \frac{1}{2}KS + \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - EK.GS}$

also $KI^2 - IK.KS + \frac{1}{4}KS^2 \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right. \frac{1}{4}KS^2 - EK.GS$

folglich $KI^2 \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right. \left\{ \begin{matrix} IK.KS \\ IK(KG+GS) \\ (IK-KE)GS \\ IE.GS \end{matrix} \right\} - EK.GS + IK.KG$

mithin $KI(IK-KG) \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right. IE.GS$
$KI.IG \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right. IE.GS$

somit $KI : IE \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right. \left\{ \begin{matrix} SG \\ MN \end{matrix} \right\} : IG$
$OF : FE$
$VN : \left\{ \begin{matrix} NG \\ FI \end{matrix} \right\}$

demnach $VN : NM \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right. FI : IG$
$p : q$

Beweis.

Es ist $EI > \sqrt{GE.EK}$

also $GE.EK + EI^2 > 2EI\sqrt{GE.EK}$

folglich $GE.EK > EI(2\sqrt{GE.EK} - EI)$

mithin $IE : EK < GE : 2\sqrt{GE.EK} - \left\{ \begin{matrix} EI \\ IG-GE \end{matrix} \right.$

somit $\left.\begin{matrix} IE : EK \\ FI : OK \end{matrix}\right\} < \left\{\begin{matrix} GE+EI \\ IG \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}-IG$

demnach $FI : IG < OK : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}-IG$

also $FI : IG < OK+FI : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

folglich $\left.\begin{matrix} p : q \\ VN : \left\{\begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix}\right. \end{matrix}\right\} < \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

somit $GS > GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

mithin schneidet der Kreis die Linie TU.

Ferner ist $p : q \lessgtr FI : IG$

also $KI \lessgtr KX$, wie leicht aus der Analysis erhellet.

Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 4. Bew.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.

Zus. 1.

Buchst., wie 8. Zus. 1.

Zus. 2.

Buchst., wie 3. Zus. 2.

b.) auf er Linie IE. (Fig. 61 — 65.). (Loc. V.)

Fall 1.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, GC. (Fig. 61.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. IV. Fall 1. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Determination.

Da (lib. I. loc. IV. Fall 1. Zus. 2.) die durch beide Durchschnittspunkte des Kreises und der Linie TÜ bestimmten Punkte X, X′ auf verschiedenen Seiten des Punktes E liegen, so mufs, damit X auf IC falle, $KI \leqq K\alpha + \alpha X$ seyn, wenn $K\alpha = \alpha S$.

Es ist aber $\left.\begin{matrix} KX.XS \\ K\alpha^2 \\ \frac{1}{4}KS^2 \end{matrix}\right\} - \alpha X^2 \Big\} = EK.GS$

also $\alpha X = \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - EK.GS}$

folglich mufs seyn $KI \leqq \frac{1}{2}KS + \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - EK.GS}$

mithin $KI^2 - IK.KS + \frac{1}{4}KS^2 \leqq \frac{1}{4}KS^2 - EK.GS$

somit $KI^2 \leqq \left\{\begin{matrix} IK.KS \\ IK(KG+GS) \\ (IK-KE)GS \\ IE.GS \end{matrix}\right\} - EK.GS + IK.KG$

demnach $\left.\begin{matrix} KI(IK-KG) \\ KI.IG \end{matrix}\right\} \leqq IE.GS$

also $\left.\begin{matrix} KI : IE \\ OF : FE \\ VN : \left\{\begin{matrix} NG \\ FI \end{matrix}\right. \end{matrix}\right\} \leqq \left\{\begin{matrix} SG \\ MN \end{matrix}\right\} : GI$

folglich $VN : NM \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right. FI : IG$
$p : q$

Beweis.

Es ist $p : q \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right. FI : IG$ (Det.)

also $KI \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right. KX$, wie aus der Determination leicht erhellet.

Ferner ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. IV. Fall 1. Bew.)

also $FI : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien EH, IA, IS in W, Z, Y schneidende gerade Linie OY ist

$EW : GY \left\{ \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} \right. VG : GS$ (lib. I. loc. IV. Fall 1. Zus. 1.)

also ist $FZ : GY \left\{ \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} \right. p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.)

folglich bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie IS gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' der Linie TU und des Kreises ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe (lib. I. loc. IV. Fall 1. Zus. 2.) die Linie EK in dem Punkte X' so, dafs, wenn die, die Linien EH, FB in H', L' schneidende gerade Linie OL' gezogen wird,

$EH' : GX' = OK : GS$ (lib. I. loc. IV. Fall 1. Zus. 2.)

also $FL' : GX' = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

mithin ist eine Linie OX' gefunden, welche von den Linien FB, GD Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 4. ist.

Fall 2.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FI, IG. (Fig. 62.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. IV. Fall 1. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Determination.

Da (lib. I. loc. IV. Fall 1. Zus. 2) die durch beide Durchschnittspunkte des Kreises und der geraden Linie TU bestimmten Punkte X, X' auf verschiedenen Seiten des Punktes E liegen, so mufs, damit X auf GI falle, seyn $KI \gtreqless K\alpha + \alpha X$, wenn $K\alpha = \alpha S$.

Es ist aber $KX.XS \left\{ \begin{matrix} K\alpha^2 \\ \frac{1}{4}KS^2 \end{matrix} \right\} = EK.GS \left\{ \begin{matrix} -\alpha X^2 \\ \end{matrix} \right\}$

also $\alpha X = \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - EK.GS}$

folglich mufs seyn $KI \gtreqless K\alpha + \alpha X$

also $p : q \gtreqless FI : IG$ (wie zu Fall 1.)

Beweis.

Es ist $p : q \gtreqless FI : IG$ (Det.)

also $KI \gtreqless KX$, wie leicht aus der Determination erhellet.

Ferner ist EH : GX = OK : GS (lib. I. loc. IV. Fall 1. Bew.)

also FL : GX = p : q (wie lib. II loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien EH, GI, IF in W, Y, Z schneidende gerade Linie OZ ist

$$EW : GY \gtrless VG : GS$$

also ist $FZ : GY \gtrless p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.)

folglich bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie E I kleinere Verhältnisse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Buchst., wie Fall 1. Zus. 2.

Fall 3.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FI, GK. (Fig. 63.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. IV. Fall 2. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Beweis.

Es ist EH : GX = OK : GS (lib. I. loc. IV. Fall 2. Bew.)

also FL : GX = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien EH, EG, FI in W, Y, Z schneidende gerade Linie OZ ist

$EW : GY \gtrless VG : GS$

also ist $FZ : GY \gtrless p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.) folglich bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie GE gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' der Linie TU und des Kreises ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die verlängerte IK in einem Punkte X' so, dafs, wenn die, die Linien EH, IA in H', L' schneidende gerade Linie OX' gezogen wird, $EH' : GX' = VG : GS$ (lib. I. loc. IV. Fall 2. Zus. 2.)

also $FL' : GX' = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.)

Es ist mithin eine Linie OX' gefunden, welche von den Linien FA, GD Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 5. ist.

Fall 4.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FB, GD. (Fig. 64.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. IV. Fall 3. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Beweis.

Es ist $EH : GX = VG : GS$ (lib. I. loc. IV. Fall 3.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien EK, EH, FB in Y, W, Z schneidende gerade Linie OZ ist

$$EW : GY \lesseqgtr VG : GS \quad \text{(lib. I. loc. IV. Fall 3. Zus. 1.)}$$

---

also $FZ : GY \lesseqgtr p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.)

folglich bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie EK kleinere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' der Linie TU und des Kreises ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie GS in einem Punkte X' so, dafs, wenn die, die Linien EH, FA in H', L' schneidende gerade Linie OX' gezogen wird,

$$EH' : GX' = VG : GS \quad \text{(lib. I. loc. IV. Fall 3. Zus. 1.)}$$

---

also $FL' : GX' = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Es ist mithin eine Linie OX' gefunden, welche von den Linien FA, GC Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, und der Punkt X' liegt auf IC, oder in I, oder auf IG, je nachdem $p : q \left\{\begin{matrix} < \\ = \\ > \end{matrix}\right\} FI : IG$, welches aus Fall 1. 2. erhellet.

Fall 5.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, GD. (Fig. 65.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. II. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. IV. Fall 4. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Beweis.

Es ist EH : GX=OK:GS (lib. I. loc. IV. Fall 4. Bew.)

also FL : GX=p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien KD, EH, IA in Y, W, Z schneidende gerade Linie OY ist

$$EW : GY \gtrless VG : GS \text{ (lib. I. loc. IV. Fall 4. Zus. 1.)}$$

also auch $FZ : GY \gtrless p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.)

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie KD kleinere Verhältnisse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' der Linie TU und des Kreises ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie GE in einem Punkte X' so, dafs, wenn die, die Linien EH, FI in H', I' schneidende gerade Linie OX' gezogen wird, EH' : GX'=OK : GS (lib. I. loc. IV. Fall 4. Zus. 2.)

also FI' : GX'=p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

folglich ist eine Linie OX' gefunden, welche von den Linien FI, GK Segmente in dem gegebenen Verhältnisse abschneidet, welches Fall 3. ist.

c.) in dem Punkte E. (Fig. 66—69.). (Loc. VI.)

Fall 1.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, GC. (Fig. 66.)

Analysis.

Es sey LX die gesuchte Linie. Zieht man EH # AB, welche der geraden Linie OX in H begegne, so ist FL : EH = FO : OE, also ist das Verhältnifs FL : EH gegeben. Da auch das Verhältnifs FL : GX gegeben ist, so ist das Verhältnifs EH : GX gegeben, folglich die Aufgabe auf lib. I. loc. III. Fall 1. reducirt.

Construction.

Man ziehe OF, OK # AB # VGN, OV # CD # FN, mache NP = p, NQ = q, ziehe VM # PQ, MS # AB, OX # VS, so sind FL, GX die gesuchten Segmente.

Determination.

Da KX $\left\{\begin{matrix}=\\>\end{matrix}\right.$ KI werden soll, so mufs seyn OK : KX $\left\{\begin{matrix}=\\<\end{matrix}\right.$ OK : KI
HG : GX

Da aber FL : GH = FO : OE
= NV : $\left\{\begin{matrix}VG\\OK\end{matrix}\right.$

---

so mufs seyn FL : GX $\left\{\begin{matrix}=\\<\end{matrix}\right.$ NV : KI
p : q $\left\{\begin{matrix}=\\<\end{matrix}\right.$ OK + FI : IK

Beweis.

Es ist p : q $\left\{\begin{matrix}=\\<\end{matrix}\right.$ $\left\{\begin{matrix}OK+FI\\VN\end{matrix}\right.$: IK (Det.)
VN : NM $\left\{\begin{matrix}=\\<\end{matrix}\right.$ $\left\{\begin{matrix}OK+FI\\VN\end{matrix}\right.$

---

also MN $\left\{\begin{matrix}=\\>\end{matrix}\right.$ KI
GS

---

folglich $VG : GS \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} OK : KI$
$HG : GX$
$OK : KX$

mithin $KX \left\{ \begin{matrix} = \\ > \end{matrix} \right\} KI$

Ferner ist $HG : GX = OK : GS$
$FL : GH = FO : OG$
$= NV : VG$

also $FL : GX = NV : \left\{ \begin{matrix} GS \\ MN \end{matrix} \right.$
$= p : q$

Zus.

Für eine andere, die Linien EH, IA, IS in W, Z, Y schneidende gerade Linie ist

$WG : GY \left\{ \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} \right\} VG : GS$ (lib. I. loc. III. Fall 1. Zus.)

also $FZ : GY \left\{ \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} \right\} p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.)

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie IS gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Fall 2.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FI, IG. (Fig. 67.)

Analysis.

Buchst., wie zu Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. III. Fall 1. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu Fall 1.

Determination.

Damit $KX \lessgtr KI$ werde, mufs seyn

$$\left.\begin{matrix} OK : KX \\ HG : GX \end{matrix}\right\} \gtrless \left.\begin{matrix} OK \\ \end{matrix}\right\} : KI$$

Da $FL : GH = FO : OE$

$$= NV : \left\{\begin{matrix} VG \\ OK \end{matrix}\right.$$

---

so mufs $\left.\begin{matrix} FL : GX \\ p : q \end{matrix}\right\} \gtrless \left\{\begin{matrix} NV : KI \\ OK+FI : IK \end{matrix}\right.$ seyn

Damit $KX > KE$ werde, mufs seyn

$VG : GS < OK : KE$ (lib. I. loc. III. Fall 1. Det.)

---

also $GS > KE$

---

folglich $VN : \left\{\begin{matrix} GS \\ NM \end{matrix}\right\} < OK+FI : KE$

$p : q$

Beweis.

Es ist $\left.\begin{matrix} p : q \\ VN : NM \end{matrix}\right\} \gtrless \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix}\right\} : IK$

---

also $\left.\begin{matrix} MN \\ GS \end{matrix}\right\} \lessgtr KI$

---

folglich $\left.\begin{matrix} VG : GS \\ HG : GX \\ OK : KX \end{matrix}\right\} \gtrless OK : KI$

---

mithin $KX \lessgtr KI$

$$\text{Ferner ist } \left.\begin{matrix} p:q \\ VN:NM \end{matrix}\right\} < \left\{\begin{matrix} OK+FI \\ VN \end{matrix}\right\} : KE$$

also $MN > KE$

$$\text{folglich } \left.\begin{matrix} OK \\ VG \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} MN \\ GS \end{matrix}\right\} < OK : KE$$

mithin $KX > KE$

Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. III. Fall 1. Bew.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus.

Für eine andere, die Linien EH, EI, IF in W, Y, Z schneidende gerade Linie OZ ist

$$WG : GY \gtrless VG : GS \text{ (lib. I. loc. III. Fall 1. Zus.)}$$

also $FZ : GY \gtrless p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.)

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie EI kleinere Verhältnisse, als die entfernteren.

Fall 3.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FB, GK. (Fig. 68.)

Analysis.

Buchst., wie zu Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. III. Fall 2. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu Fall 1.

Determination.

Damit der Punkt X zwischen K, G liege, mufs seyn

$OK : GS > OK : KG$ (lib. I. loc. III. Fall 2. Det.)

also $\left.\begin{matrix} GS \\ MN \end{matrix}\right\} < KG$

folglich $VN : NM \left.\begin{matrix} \\ \\ p : q \end{matrix}\right\} > OK + FI : KG$

Beweis.

Es ist $p : q \left.\begin{matrix} \\ \\ \\ \end{matrix}\right\} > OK + FI : KG$

$VN : \left\{\begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix}\right\}$

folglich $GS < KG$

mithin $VG : GS > OK : KG$

somit $KX < KG$ (lib. I. loc. III. Fall 2. Bew.)

Auch ist $EH : GX = VG : GS$ (lib. I. loc. III. Fall 2.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. II. Fall 1. Bew.)

Zus.

Für eine andere, die Linien KE, EH, FB in Y, W, Z schneidende gerade Linie OZ ist

$WG : GY \lessgtr VG : GS$ (lib. I. loc. III. Fall 2. Zus. 1.)

also $FZ : GY \lessgtr p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.)

folglich bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie KE kleinere Verhältnifse, als die entfernteren.

Fall 4.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, GD. (Fig. 69.)

Analysis.

Buchst., wie zu Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. III. Fall 3. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu Fall 1.

Beweis.

Es ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. III. Fall 3. Bew.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus.

Für eine andere, die Linien KD, EH, IA in Y, W, Z schneidende gerade Linie ist

$EW : GY \gtrless VG : GS$ (lib. I. loc. III. Fall 3. Zus.)

also $FZ : GY \gtrless p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus.)

folglich bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie KD gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

II. auf IA (siehe pag. 58.). (Fig. 70 — 104.). Zieht man durch O die gerade Linie Oa # CD, und bezeichnet man mit a den Durchschnit derselben mit der Linie IA, so liege F.

1.) in a. (Fig. 70 — 79.). Der Punkt G liege

A.) auf der Linie IC. Dieser Fall ist erlediget durch lib. II. loc. II.

B.) auf der Linie ID. (Fig. 70 — 79.) Bezeichnet man mit K den Durchschnitt

der Linie CD mit einer durch O mit AB gezogenen Parallellinie OK, so liege der Punkt G

α.) in K. (Fig. 70—72.) (Loc. VII.).

Fall 1.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, KD. (Fig. 70.)

Analysis.

Es sey LX die gesuchte Linie, so ist

$$\left.\begin{matrix} FL : GX \\ FL.GX \\ (El.VI.\ 4.16.)\ FO.OK \end{matrix}\right\} : GX^2 \left\{ = p : q \right.$$

folglich GX, somit X, und OX der Lage nach gegeben.

Construction.

Man mache $HK = KO$, $IKT = R$, $KP = p$, $KQ = q$, beschreibe über IH, PQ als Durchmessern Kreise, welche die Linie KT in T, R schneiden, ziehe $TX \# RQ$, und verbinde die Punkte O, X durch die gerade Linie OX, welche in L der Linie FA begegne, so ist LX die gesuchte Linie.

Beweis.

$$\text{Es ist } FL : GX = \left\{\begin{matrix} FL.GX \\ FO.OK \\ IG.GH \\ TG^2 \end{matrix}\right\} : GX^2$$

$$= RG^2 : GQ^2$$

$$= \left\{\begin{matrix} PG : GQ \\ p : q \end{matrix}\right.$$

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien GD, FA in Y, Z schneidende gerade Linie OY ist

$$FZ \gtrless FL \ , \ GY \lessgtr GX$$

also $FZ : GY \gtrless FL : GX$

folglich bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie GD gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Zieht man durch den zweiten Durchschnitt T' des über IH beschriebenen Kreises mit TK eine, die Linie CD in X' schneidende, mit RQ parallele Linie, so liegt X' zwischen G, I, oder in I, oder zwischen I, C, je nachdem $KX' \left\{ \begin{matrix} < \\ = \\ > \end{matrix} \right\} KI$

also $T'K : KX' \left\{ \begin{matrix} > \\ = \\ < \end{matrix} \right\} T'K : KI$

folglich $T'K^2 : KX'^2 \left\{ \begin{matrix} > \\ = \\ < \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} T'K^2 \\ IK.KO \\ FI : IK \end{matrix} \right\} : KI^2$

$p : q$

und es ist, wenn die, die Linie AB in L' schneidende gerade Linie OX' gezogen wird, $FL' : GX' = \left\{ \begin{matrix} FL'.GX' \\ FO.OK \\ T'G^2 \end{matrix} \right\} : GX'^2$

$= RG^2 : GQ^2$

$= p : q$

Es ist also eine Linie OX' gefunden, welche von den Linien FI, GC, oder FB, GC Segmente in

dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 2., oder Fall 3. ist.

Fall 2.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FB, GI. (Fig. 71.)

Analysis. Construction.

Buchst., wie zu Fall 1.

Determination.

Da $KI \gtreqless KX$ werden soll, so mufs seyn

$$TK : KI \gtreqless TK : KX$$

also
$$\left.\begin{matrix} TK^2 \\ IK.KO \\ OK : KI \\ FI : IK \end{matrix}\right\} : KI^2 \left\{\begin{matrix} = \\ < \end{matrix}\right. \left\{\begin{matrix} TK^2 : KX^2 \\ RK^2 : KQ^2 \\ p : q \end{matrix}\right.$$

Beweis.

$$\text{Es ist } \left.\begin{matrix} FI : IK \\ QK : KI \\ IK.KO \\ TK^2 \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} = \\ < \end{matrix}\right. \left\{\begin{matrix} p : q \text{ (Det.)} \\ RK^2 : KQ^2 \\ TK^2 : KX^2 \end{matrix}\right. \left.\begin{matrix} \\ \\ \\ : KI^2 \end{matrix}\right\}$$

also $KI \gtreqless KX$

Auch ist $FL : GX = FL.GX : GX^2$

also $FL : GX = p : q$ (wie Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien GC, FB in Y, Z schneidende gerade Linie OZ ist

$$FZ \gtrless FL \ , \ GY \lessgtr GX$$

$$\text{also } FZ : GY \gtrless FL : GX$$

folglich bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der geraden Linie IK kleinere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Zieht man durch den zweiten Durchschnitt T' des über HI beschriebenen Kreises mit TK eine, die Linie CD in X' schneidende, mit RQ parallele Linie, so ist, wenn die, die Linie AB in L' schneidende gerade Linie OX' gezogen wird, FL':GX'=p:q (wie Fall 1. Zus. 2.). Es ist also eine Linie OX' gefunden, welche von den Linien FA, GD Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 1. ist.

Fall 3.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FI, GC. (Fig. 72.)

Analysis. Construction.

Buchst., wie zu Fall 1.

Determination.

Da $KX \gtrless KI$ werden soll, so mufs seyn

$$TK : KI \gtrless TK : KX$$

$$\left.\begin{matrix} \text{also } TK^2 \\ IK.KO \\ FI.IK \end{matrix}\right\} : \left\{ KI^2 \right\} \gtrless \left\{\begin{matrix} TK^2 : KX^2 \\ RK^2 : KQ^2 \\ p : q \end{matrix}\right.$$

$$FI : IK$$

Beweis.

$$\text{Es ist } \left.\begin{matrix} FI \\ FI.IK \\ IK.KO \\ TK^2 \end{matrix}\right\} : IK^2 \left\{\begin{matrix} = \\ > \end{matrix}\right\} \left.\begin{matrix} p : q \text{ (Det.)} \\ RK^2 : KQ^2 \\ TK^2 : KX^2 \end{matrix}\right.$$

$$\text{also } KI \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} KX$$

$$\text{Auch ist } FL : GX = FL.GX : GX^2$$

$$\text{also } FL : GX = p : q \text{ (wie zu Fall 1.)}$$

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien IC, IF in Y, Z schneidende gerade Linie OY ist

$$FZ \begin{matrix} < \\ > \end{matrix} FL \ , \ GY \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} GX$$

$$\text{also } FZ : GY \begin{matrix} < \\ > \end{matrix} FL : GX$$

folglich bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Buchst., wie Fall 2. Zus. 2.

b.) auf der Verlängerung der Linie IK. (Fig. 73 — 75.) (Loc. VIII.)

Fall 1.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, GD. (Fig. 73.)

Analysis.

Es sey LX die gesuchte Linie, so ist $\left.\begin{matrix} FL \\ FL.KX \\ FO.OK \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} GX \\ GX.XK \end{matrix}\right. = p : q$

also ist GX.XK gegeben. Da auch KX–XG=GK gegeben ist, so ist (Dat. 85.) GX, somit der Punkt X, und die gerade Linie OX der Lage nach gegeben.

Construction.

Man mache OK#AB, IKH = R, HK = KO, EK = KI, KP = p, KQ = q, beschreibe über HE, PQ Halbkreise, welche der Linie ID in N, V begegnen, ziehe PN, mache KVR = KPN, KT = TG, und beschreibe aus T als Mittelpunkt einen Kreis mit einem Radius = TR, welcher die KD in X schneide, so ist die gerade Linie OX die gesuchte.

Beweis.

Es ist NK : KR = PK : KV

also $\left.\begin{matrix} NK^2 \\ EK.KH \\ IK.KO \\ FO.OK \\ FL.KX \\ FL \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} KR^2 \\ KX.XG \\ GX \end{matrix}\right. = \left\{\begin{matrix} PK^2 : KV^2 \\ = PK : KQ \\ = p : q \end{matrix}\right.$

Zus. 1.

Buchst., wie lib. II. loc. VII. Fall 1. Zus. 1.

Zus. 2.

Bezeichnet man mit X′ den zweiten Durchschnitt des mit einem Radius = TR beschriebenen Kreises mit der Linie CT, so fällt X′ zwischen I, C, oder in I, oder zwischen I, K,

$$\text{je nachdem } IK \left\{\begin{matrix}<\\=\\>\end{matrix}\right\} KX' \;,\; IG \left\{\begin{matrix}<\\=\\>\end{matrix}\right\} GX'$$

$$\text{also } KI.IG \left\{\begin{matrix}<\\=\\>\end{matrix}\right\} KX'.X'G$$

$$\text{folglich } \left.\begin{matrix} FI.IK : KI.IG \\ FI : IG \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} \left\{\begin{matrix} FI.IK \\ EK.KH \\ NK^2 \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} KX'.X'G \\ KR^2 \end{matrix}\right. \\ PK^2 : KV^2 \\ p : q \end{matrix}\right.$$

$$\text{Auch ist } \left.\begin{matrix} NK^2 \\ FO.OK \\ FL'.KX' \end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix} KR^2 \\ KX'.X'G \end{matrix}\right\} = p : q$$

$$FL' : KX'$$

Es ist also eine Linie OX′ gefunden, welche von den Linien FB, GC, oder FI, GC Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 3., oder Fall 4. ist.

Fall 2.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, GK. (Fig. 74)

Analysis.

Buchst., wie zu Fall 1., wenn KX + XG statt KX − XG, und Dat. 86. statt Dat. 85. gesetzt wird.

Construction.

Man bestimme KR, wie in Fall 1., ziehe RM # CD, welche einem über KG beschriebenen Halbkreise in M begegne, fälle von M ein Perpendikel

MX auf CD, und ziehe OX, welche der Linie IA in L begegne, so sind FL, GX die gesuchten Segmente.

Determination.

Damit RM den über KG beschriebenen Halbkreis erreiche, mufs seyn $KR \leqq \frac{1}{2}KG$.

Nun ist $NK : KR = PK : KV$

also $\left.\begin{matrix} NK^2 \\ HK.KE \\ FO.OK \end{matrix}\right\} : KR^2 = PK^2 : KV^2 = p : q$

folglich mufs seyn $p : q \geqq FO.OK : \frac{1}{4}KG^2$

Beweis.

Es ist $\left.\begin{matrix} p : q \\ PK^2 : KV^2 \\ NK^2 \\ FO.OK \end{matrix}\right\} : KR^2 \geqq FO.OK : \frac{1}{4}KG^2$ (Det.)

also $KR^2 \geqq \frac{1}{4}KG^2$

folglich $KR \geqq \frac{1}{2}KG$

mithin berührt (Fig. 74. a.), oder schneidet (Fig. 74. b.) der Kreis die Linie RM.

Nun ist $NK : KR = PK : KV$

also $FL : GX = p : q$ (wie zu Fall 1.)

Zus. 1.

Für eine, in Fig. 74. a. die Linien KG, FA in Y, Z schneidende gerade Linie OX ist

$$KY.YG < KX.XG \quad \text{(El. II. 5.)}$$

$$\left.\begin{matrix}\text{also } NK^2 \\ FO.OK \\ FZ.KY\end{matrix}\right\} : KY.YG \Big\} > \Big\{ \left.\begin{matrix}NK^2 \\ \\ p : q\end{matrix}\right\} : \left\{\begin{matrix}KX.XG \\ KR^2\end{matrix}\right.$$
$$FZ : GY$$

folglich bestimmt der Halbirungspunkt von KG ein kleineres Verhältnifs, als jeder andere Punkt dieser Linie.

Auch ist für eine, die Linien KG, FA in γ, δ schneidende gerade Linie Oδ, wenn $\gamma X > XY$,

$$K\gamma.\gamma G < KY.YG \quad \text{(El. II. 5.)}$$

$$\left.\begin{matrix}\text{also } NK^2 \\ FO.OK \\ F\delta.K\gamma\end{matrix}\right\} : K\gamma.\gamma G \Big\} > \Big\{ \left.\begin{matrix}NK^2 \\ FO.OK \\ FZ.KY\end{matrix}\right\} : KY.YG$$
$$F\delta : G\gamma \qquad\qquad FZ : GY$$

mithin bestimmt jeder dem Halbirungspunkte von KG näher liegende Punkt dieser Linie ein kleineres Verhältnifs, als der entferntere.

Zus. 2.

Fällt man in Fig. 74. b. von dem zweiten Durchschnitte M' ein Perpendikel M'X' auf CD, so ist auch, wenn die Linie OX' die Linie FA in L' schneidet, $FL' : GX' = p : q$, wie vorhin.

Fall 3.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FI, GX. (Fig. 75. a.)

Analysis. Construction.

Buchst., wie zu Fall 1.

Determination.

Damit X auf IC falle, mufs werden

$$IK \gtrless KX \quad , \quad IG \gtrless GX$$

also $KI.IG \gtrless KX.XG$

folglich
$$\left.\begin{matrix} FI.IK : KI.IG \\ FI : IG \end{matrix}\right\} \gtrless \left\{\begin{matrix} \left.\begin{matrix} FO.OK \\ FL.KX \end{matrix}\right\} : KX.XG \\ FL : GX \\ p : q \end{matrix}\right.$$

Beweis.

$$\left.\begin{matrix} \text{Es ist } p : q \\ PK : KQ \\ PK^2 : KV^2 \\ NK^2 : KR^2 \end{matrix}\right\} \gtrless \left\{\begin{matrix} FI : IG \\ \left.\begin{matrix} FI.IK \\ NK^2 \end{matrix}\right\} : KI.IG \end{matrix}\right.$$

$$\left.\begin{matrix} \text{also } KR^2 \\ TR^2 \\ TX^2 \end{matrix}\right\} \gtrless \left\{\begin{matrix} KI.IG \\ TI^2 - TK^2 \end{matrix}\right.$$

folglich $TX^2 \gtrless TI^2$

mithin $TX \gtrless TI$

Ferner ist $NK : KR = PK : KV$

also $FL : GX = p : q$ (wie zu Fall 1.)

Zus. 1.

Buchst., wie lib. II. loc. VII. Fall 3. Zus. 1.

Zus. 2.

Zieht man durch den zweiten Durchschnitt X' der Linie KT und des aus T als Mittelpunkt mit TR als

Radius beschriebenen Kreises die gerade Linie OX', welche 1H in L' schneide, so ist FL' : GX' = p : q, wie aus Fall 1. Bew. erhellet. Es ist also eine Linie OX' gefunden, welche von den Linien FA, GD Segmente in dem gegebenen Verhältnisse abschneidet, welches Fall 1. ist.

Fall 4.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FB, GI. (Fig. 75. b.)

Analysis. Construction.

Buchst., wie zu Fall 1.

Determination.

Damit X auf KI liege, mufs seyn

$$KX \leqq KI \ , \ GX \leqq GI$$

---

also $KI.IG \geqq KX.XG$

---

folglich
$$\left.\begin{matrix} FI.IK : KI.IG \\ FI : IG \end{matrix}\right\} \leqq \left\{\begin{matrix} \left.\begin{matrix} FO.OK \\ FL.KX \end{matrix}\right\} : KX.XG \\ FL : GX \\ p : q \end{matrix}\right.$$

Beweis.

$$\left.\begin{matrix} \text{Es ist } p : q \\ PK : KQ \\ PK^2 : KV^2 \\ NK^2 : KR^2 \end{matrix}\right\} \geqq \left\{\begin{matrix} FI : IG \\ \left.\begin{matrix} FI.IK \\ NK^2 \end{matrix}\right\} : KI.IG \end{matrix}\right.$$

$$\text{also } KR^2 \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} KI.IG$$
$$TR^2 - TK^2 \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} TI^2 - TK^2$$

$$\text{folglich } TR \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\} TI$$
$$TX \left\{ \begin{matrix} = \\ < \end{matrix} \right\}$$

Ferner ist $NK : KR = PK : KV$

also $FL : GX = p : q$ (wie zu Fall 1.)

Zus. 1.

Buchst., wie lib. II. loc. VII. Fall 3. Zus. 1.

Zus. 2.

Buchst., wie Fall 3. Zus. 2.

c.) auf der Linie KI. (Fig. 76 — 79.) (Loc. IX.).

Fall 1.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, GD. (Fig. 76.)

Analysis.

Wie zu loc. VIII. Fall 1., wenn nur GX — XK statt KX — XG gesetzt wird.

Construction und Beweis.

Buchst., wie zu loc. VIII. Fall 1.

Zuss. 1. 2.

Buchst., wie loc. VIII. Fall 1. Zuss. 1. 2.

Fall 2.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FB, GK. (Fig. 77. a. b.)

Analysis. Construction. Determination. Beweis. Zuss.

Buchst., wie zu loc. VIII. Fall 2.

Fall 3.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FI, GC. (Fig. 78.)

Analysis. Construction. Determination. Beweis. Zuss. 1. 2.

Buchst., wie zu loc. VIII. Fall 3.

Fall 4.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FB, GI. (Fig. 79.)

Analysis. Construction. Determination. Beweis. Zuss. 1. 2.

Buchst., wie zu loc. VIII. Fall 4.

2.) auf der Verlängerung von Ia. (Fig. 80—98.) Der Punkt G liege

A.) auf der Linie IC.

Ist erlediget durch lib. II. loc. III.

B.) auf der Linie ID, namentlich, wenn OK#AB gezogen wird,

a.) in K. Ist erlediget durch lib. II. loc. VIII.

b.) auf der Linie KD. Bezeichne man mit E den Durchschnitt der Lini CD mit der geraden Linie OF, so lieg der Punkt G

a.) in E. (Fig. 80—84.) (Loc. XI.

Fall 1.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FZ GD. (Fig. 80.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist di Aufgabe auf lib. I. loc. III. Fall 1. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. VI. Fall 1.

Determination.

Vermöge lib. I. loc. III. Fall 1. Det. mufs seyn

$$VG : GS < OK : KE$$

also $\left\{\begin{matrix} GS \\ MN \end{matrix}\right\} > KE$

folglich $VN : \left\{\begin{matrix} NM \\ p : q \end{matrix}\right\} < \left\{\begin{matrix} VN : KE \\ FI - OK : KE \end{matrix}\right.$

Beweis.

Es ist $p : q \left\{\begin{matrix} < \\ \\ \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} FI - OK \\ VN \end{matrix}\right\} : KE$

$VN : \left\{\begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix}\right\}$

also $GS > KE$

folglich $VG : GS \left\{ \begin{matrix} \\ OK : KX \end{matrix} \right\} < OK : KE$

mithin $KX > KE$

Auch ist $EH : GX = VG : GS$ (lib. I. loc. III. Fall 1.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus.

Für eine andere, die Linien ES, EH, FI in Y, W, Z schneidende gerade Linie OY ist

$EW : GY \lesseqgtr VG : GS$ (lib. I. loc. III. Fall 1. Zus.)

also $FZ : GY \lesseqgtr p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. *Zus.* 1.)

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie ES gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Fall 2.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, GI. (Fig. 81.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. III. Fall 2. reducirt.

Construction.

Buchstäblich, wie zu Fall 1.

Determination.

Vermöge lib. I. loc. III. Fall 2. Det. mufs seyn

$VG : GS > OK : KE$

also $\left\{ \begin{matrix} GS \\ MN \end{matrix} \right\} < KE$

folglich $VN : NM \left\{ \begin{matrix} > \\ p : q \end{matrix} \right\} \begin{matrix} VN : KE \\ FI-OK : KE \end{matrix}$

Beweis.

Es ist $p : q \left\{ \begin{matrix} > \\ \end{matrix} \right\} \begin{matrix} FI-OK \\ VN \end{matrix} : KE$

$VN : \begin{matrix} NM \\ GS \end{matrix}$

---

also $GS < KE$

---

folglich $VG : GS \left\{ \begin{matrix} > \\ OK : KX \end{matrix} \right\} OK : KE$

---

mithin $KX < KE$

Auch ist $EH : GX = VG : GS$ (lib. I. loc. III. Fall 2.)

---

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus.

Für eine andere, die Linien EH, EK, FL in W, Y, Z schneidende gerade Linie OZ ist

$EW : GY \gtrless VG : GS$ (lib. I. loc. III. Fall 2. Zus.)

---

also $FZ : GY \gtrless p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.)

folglich bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie EK gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Fall 3.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FB, GI. (Fig. 82.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. III. Fall 3. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu Fall 1.

Determination.

Damit $KX \gtrless KI$ werde, mufs seyn

$$\left.\begin{matrix} OK : KX \\ HG : GX \end{matrix}\right\} \gtrless OK : KI$$

Da nun $FL : GH = FO : OE = NV : VG$

---

so mufs seyn $\left.\begin{matrix} FL : GH \\ p : q \end{matrix}\right\} \gtrless \left\{\begin{matrix} NV : KI \\ FI-OK : KI \end{matrix}\right.$

Beweis.

Es ist $\left.\begin{matrix} p : q \\ VN : NM \end{matrix}\right\} \gtrless \left\{\begin{matrix} FI-OK \\ NV \end{matrix}\right\} : KI$ (Det.)

---

also $\left.\begin{matrix} MN \\ GS \end{matrix}\right\} \lessgtr KI$

---

folglich $\left.\begin{matrix} VG : GS \\ HG : GX \\ OK : KX \end{matrix}\right\} \gtrless OK : KI$

---

mithin $KX \lessgtr KI$

Ferner ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. III. Fall 3. Bew.)

---

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus.

Für eine andere, die Linien BI, FK, EH in Z, Y, W schneidende gerade Linie OZ ist

$EW : GY \lessgtr VG : GS$ (lib. I. loc. III. Fall 3. Zus.)

also $FZ : GY \lessgtr p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.)

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie IK kleinere Verhältnisse, als die entfernteren.

Fall 4.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FI, GC. (Fig. 83.)

Analysis. Construction.

Buchst., wie zu Fall 3.

Determination.

Damit $KX \gtrless KI$ werde, muss seyn

$$\left.\begin{matrix} OK : KX \\ HG : GX \end{matrix}\right\} \lessgtr OK : KI$$

Da nun $FL : GH = FO : OE = NV : VG$

so muss seyn $FL : GX \lessgtr NV : KI$

$p : q \lessgtr FI - OK : KI$

Beweis.

Es ist $p : q \lessgtr FI - OK : KI$ (Det.)

$VN : NM \lessgtr NV : KI$

also $MN \lessgtr KI$

$GS \gtrless KI$

folglich $\left.\begin{matrix} VG : GS \\ HG : GX \\ OK : KX \end{matrix}\right\} \gtreqless OK : KI$

mithin $KX \gtreqless KI$

Ferner ist $EH : GX = OK : GS$

also $FL : GX = p : q$ } (wie zu Fall 3.)

Zus.

Für eine andere, die Linien CI, IF, EH in Y, Z, W schneidende gerade Linie OY ist

$EW : GY \gtreqless VG : GS$ (lib. I. loc. III. Fall 3. Zus.)

also $FZ : GY \gtreqless p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie IC gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

β.) zwischen K, E. (Fig. 84 — 90.) (Loc. XII.)

Fall 1.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FB, GL. (Fig. 84.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VI. Fall 1. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Determination.

Damit der Punkt X auf KI falle, mufs $KI \gtreqless KX$ seyn.

Nun ist $KX.XS \left\{ \begin{matrix} \\ \alpha K^2 \\ \frac{1}{4}KS^2 \end{matrix} \right\} = EK.GS$ wenn $K\alpha = \alpha S$

also $\alpha X = \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 + EK.GS}$

folglich mufs seyn $KI \gtreqless \frac{1}{2}KS + \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 + EK.GS}$

mithin $KI^2 - IK.KS + \frac{1}{4}KS^2 \gtreqless \frac{1}{4}KS^2 + EK.GS$

somit $KI^2 \gtreqless \left\{ \begin{matrix} \left\{ \begin{matrix} IK.KS \\ IK(SG-GK) \end{matrix} \right\} + EK.GS \\ \left\{ \begin{matrix} (IK+KE)GS \\ IE.GS \end{matrix} \right\} - IK.KG \end{matrix} \right.$

demnach $KI(IK+KG) \left\{ \begin{matrix} \gtreqless \\ KI.IG \end{matrix} \right\} IE.GS$

also $KI : IE \left\{ \begin{matrix} \gtreqless \\ OF : FE \\ VN : NG \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} SG \\ MN \end{matrix} \right\} : GI$

folglich $VN : NM \left\{ \begin{matrix} \gtreqless \\ p : q \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} NG : GI \\ FI : IG \end{matrix} \right.$

Beweis.

Es ist $p : q \gtreqless FI : IG$ (Det.)

also $KI \gtreqless KX$, wie aus der Determination leicht hervorgehet.

Auch ist EH : GX = OK : GS (lib. I. loc. VI. Fall 1.)

also FL : GX = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien BI, IK, EH in Z, Y, W schneidende gerade Linie OZ ist

EW : GY $\lessgtr$ VG : GS (lib. I. loc. VI. Fall 1. Zus. 1.)

also FZ : GY $\lessgtr$ p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1, Zus. 1.)

mithin bestimmen die dem Punkte K näher liegenden Punkte der Linie IK gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren,

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linien EG, FA, EH (verm. lib. I. loc. VI. Fall 1. Zus. 2.) in X' so, dafs

EH' : GX' = VG : GS

also FL' : GX' = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.)

mithin ist eine Linie OX' gefunden, welche von den Linien FA, GE Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 4. ist.

Fall 2.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FI, GC. (Fig. 85.)

Analysis. Construction.

Buchst., wie zu Fall 1.

Determination.

Damit der Punkt X auf IC falle, mufs KI $\leqq$ KX seyn:

Nun ist $KX.XS = EK.GS$

also $\alpha X = \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 + EK.GS}$ (wie Fall 1. Det.)

folglich muſs seyn $KI \lessgtr \frac{1}{2}KS + \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 + EK.GS}$

mithin $KI^2 - IK.KS + \frac{1}{4}KS^2 \lessgtr \frac{1}{4}KS^2 + EK.GS$

somit $KI^2 \lessgtr \begin{cases} IK.KS + EK.GS \\ IK.GS - IK.KG + EK.GS \\ IE.GS - IK.KG \end{cases}$

demnach $KI.IG \lessgtr IE.GS$

also $\left.\begin{matrix} KI : IE \\ VN : NG \end{matrix}\right\} \lessgtr SG : GI$

folglich $\left.\begin{matrix} VN : NM \\ p : q \end{matrix}\right\} \lessgtr FI : IG$

Beweis.

Es ist $p : q \lessgtr FI : IG$

also $KI \lessgtr KX$, wie aus der Determination leicht hervorgehet.

$\left.\begin{matrix} \text{Auch ist } EH : GX = OK : GS \\ \text{also } FL : GX = p : q \end{matrix}\right\}$ (wie zu Fall 1.)

Zuss. 1. 2.

Buchst., wie Fall 1. Zuss. 1. 2.

Fall 3.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FL, GK. (Fig. 86. 87.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VI. Fall 2. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Determination.

Vermöge lib. I. loc. VI. Fall 2. Det. muſs seyn

$$GS \gtreqless KE+EG-2\sqrt{KE.EG}$$

also $VN : GS \left\{ \begin{matrix} = \\ < \\ > \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} VN \\ FI-OK \end{matrix} \right\} : KE+EG-2\sqrt{KE.EG}$

$p : q$

Beweis.

Es ist $p : q \left\{ \begin{matrix} = \\ < \\ > \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} FI-OK \\ VN \end{matrix} \right\} : KE+EG-2\sqrt{KE.EG}$

$VN : GS$

also $GS \gtreqless KE+EG-2\sqrt{KE.EG}$

mithin berührt (Fig. 86.), oder schneidet (Fig. 87.) der Kreis die Linie TU.

Auch ist $EH : GX = VG : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 2.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, in Fig. 86. die Linien GK, EH, FA in Y, W, Z schneidende gerade Linie OY ist

$EW : GY > VG : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 2. Zus. 1.)

also $FZ : GY > p : q$ (wie lib. II. loc. IV. Fall 2. Zus. 1.)

mithin bestimmt der Halbirungspunkt X von KS, für welchen $EX = \sqrt{KE.EG}$, ein kleineres Verhältniſs, als jeder andere Punkt der Linie KS.

Auch ist für eine, die Linien GK, EH, FA in γ, β, δ schneidende gerade Linie $O\beta$, wenn $\gamma X > XY$, (vermöge desselben Zusatzes)

$$E\beta : G\gamma > EW : GY$$

also $F\delta : G\gamma > FZ : GY$ (wie lib. II. loc. IV. Fall 2. Zus. 1.) mithin bestimmen die dem Halbirungspunkte von KS näher liegenden Punkte kleinere Verhältnisse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in Fig. 87. in dem zweiten Durchschnitte R′ des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie KG (verm. lib. I. loc. VI. Fall 2. Zus. 2.) so, dafs, wenn die, die Linien EH, FA in H′, L′ schneidende gerade Linie OX′ gezogen wird,

$$EH' : GX' = VG : GS$$

also $FL' : GX' = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.) mithin ist eine zweite Linie $\delta X'$ gefunden, welche von den gegebenen Linien Segmente in dem gegebenen Verhältnisse abschneidet.

Fall 4.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, GD. (Fig. 85.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., wenn man H′, X′, L′ statt H, X, L setzt, also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VI. Fall 3. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., wenn man H′, X′, R′, L′ statt H, X, R, L setzt.

Beweis.

Es ist $EH' : GX' = VG : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 3.)

also $FL' : GX' = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien EH, EG, FA in W', Y', Z' schneidende gerade Linie OY' ist

$EW' : GY' \gtrless VG : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 3. Zus. 1.)

also $FZ' : GY' \gtrless p : q$ (wie lib. II. loc. IV. Fall 3. Zus. 1.)

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie EG gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie KC zwischen I, C, oder in I, oder zwischen K, I,

je nachdem $KI \left\{ \begin{matrix} < \\ = \\ > \end{matrix} \right\} KX$,

oder, da $KX.XS = EK.GS$

folglich $\alpha X = \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 - EK.GS}$, wenn $K\alpha = \alpha S$

je nachdem $KI \left\{ \begin{matrix} < \\ = \\ > \end{matrix} \right\} \frac{1}{2}KS + \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 + EK.GS}$

also $p : q \left\{ \begin{matrix} < \\ = \\ > \end{matrix} \right\} FI : IG$ (wie Fall 1. 2.)

Auch ist $EH : GX = VG : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 3. Zus. 2.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

mithin ist eine Linie OX gefunden, welche von den Linien FI, GC, oder FB, GI Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 1., oder Fall 2. ist.

Fall 5.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FZ, GD. (Fig. 88. 89.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VI. Fall 4. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Determination.

Vermöge lib. I. loc. VI. Fall 4. Det. mufs seyn

$$GS \gtreqless GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$$

also $VN : \left\{\begin{matrix} GS \\ NM \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} \\ \\ \end{matrix}\right\} \gtreqless \left\{\begin{matrix} VN \\ FI-OK \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

$p : q$

Beweis.

Es ist $p : q \left\{\begin{matrix} \\ VN : GS \end{matrix}\right\} \gtreqless \left\{\begin{matrix} FI-OK \\ VN \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

folglich $GS \gtreqless GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

mithin berührt (Fig. 88.), oder schneidet (Fig. 89.) der Kreis die Linie TU.

Ferner ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 4.)

also $FL : GX = p:q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, in Fig. 88. die Linien ES, EH, FI in Y, W, Z schneidende gerade Linie OY ist

EW : GY < VG : GS (lib. I. loc. VI. Fall 4. Zus. 1.)

---

also FZ : GY < p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.)

mithin bestimmt der Punkt X, für welchen $EX = \sqrt{GE.EK}$, ein gröfseres Verhältnifs, als jeder andere Punkt der Linie ES.

Für eine, die Linien ES, EH, FI in γ, β, δ schneidende gerade Linie $O\gamma$ ist, wenn $\gamma X > XY$, (verm. desselben Zusatzes)

$E\beta : G\gamma < EW : GY$

---

also $F\delta : G\gamma < FZ : GY$ (wie lib. II. loc. III. Fall 4. Zus. 1.)

mithin bestimmen die dem Punkte X näher liegenden Punkte gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in Fig. 89. in dem zweiten Durchschnitte R' des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie ES in einem Punkte X', so, dafs, wenn die, die Linien EH, FI in H', I' schneidende gerade Linie OX' gezogen wird,

EH' : GX' = VG : GS (lib. I. loc. VI. Fall 4. Zus. 2.)

---

also FI' : GX' = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.)

Es ist mithin eine zweite Linie gefunden, welche von den gegebenen Linien Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet.

γ.) auf der Verlängerung von KE. (Fig. 90 — 92.) (Loc. XIII.)

Fall 1:

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FI, GD. (Fig. 90.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. IV. Fall 1. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Beweis.

Es ist EH : GX = VG : GS (lib. I. loc. IV. Fall 1.)

also FI : GX = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien GS, EH, FI in Y, W, Z schneidende gerade Linie OY ist

$$EW : GY \gtrless VG : GS \text{ (lib. I. loc. IV. Fall 1. Zus. 1.)}$$

also $FZ : GY \gtrless p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.)

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie GS gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' der Linie TU und des Kreises ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe (verm. lib. I. loc. IV. Fall 1. Zus. 2.) die Linie EK in einem Punkte X' so, dafs, wenn die, die Linien EH, FA in H', L' schneidende gerade Linie OX' gezogen wird,

$EH' : GX' = VG : GS$

also $FL' : GX' = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.) mithin ist eine Linie OX' gefunden, welche von den Linien FA, GC Segmente in dem gegebenen Verhältnisse abschneidet, welches Fall 3. ist.

Fall 2.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FI, GE. (Fig. 91.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. IV. Fall 2. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Beweis.

Es ist $EH : GX = VG : GS$ (lib. I. loc. IV. Fall 2.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien GS, EH, FI in Y, W, Z schneidende gerade Linie OY ist

$EW : GY \gtrless VG : GS$ (lib. I. loc. IV. Fall 2. Zus. 1.)

also $FZ : GY \gtrless p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie EG kleinere Verhältnisse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf

TU, so fällt der Durchschnitt X″ desselben mit der Linie KC zwischen K, I, oder auf I, oder zwischen I, C, je nachdem $KI \left\{ \begin{matrix} > \\ = \\ < \end{matrix} \right\} KX'$

oder, je nachdem $p:q \left\{ \begin{matrix} > \\ = \\ < \end{matrix} \right\} FI:IG$, wie aus Fall 4. und Fall 5. erhellet. Und es ist, wenn die, die Linien EH, IB in H′, L′ schneidende gerade Linie OX′ gezogen wird, EH′ : GX′ = VG : GS (lib. I. loc. IV. Fall 2. Zus. 2.)

also FL′ : GX′ = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.)

mithin ist eine Linie OX′ gefunden, welche von den Linien FB, GI, oder FI, GC Segmente in dem gegebenen Verhältnisse abschneidet, welches Fall 4., oder Fall 5. ist.

Fall 3.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, GI. (Fig. 90.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., wenn man daselbst L′, X′, H′ statt L, X, H setzt, also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. IV. Fall 3. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., wenn man daselbst R′, X′, H′, L′ statt R, X, H, L setzt.

Beweis.

Es ist EH′ : GX′ = OK : GS (lib. I. loc. IV. Fall 3.)

also FL′ : GX′ = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien EH, KE, FA in Y' W', Z' schneidende gerade Linie OY' ist

$$EW' : GY' \gtrless VG : GS \text{ (lib. I. loc. IV. Fall 3.)}$$

also $FZ' : GY' \gtrless p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.) mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie KE gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie GD in dem Punkte X so, dafs, wenn die, die Linien EH, FI in H, L schneidende gerade Linie OX gezogen wird,

$$EH : GX = VG : GS \text{ (lib. I. loc. IV. Fall 3. Zus. 2.)}$$

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.) mithin ist eine Linie OX gefunden, welche von den Linien FI, GD Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 1. ist.

Fall 4.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FB, GI. (Fig. 91.)

Analysis.

Buchst., wie zu Fall 3., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. IV. Fall 3. reducirt.

Construction.

Buchstäblich, wie zu Fall 3.

Determination.

Damit X' auf KI liege, muſs $KI \gtreqless KX'$ seyn.

Nun ist $KX'.X'S \left\{ \begin{matrix} \alpha X'^2 - \left\{ \begin{matrix} \alpha K^2 \\ \frac{1}{4}KS^2 \end{matrix} \right. \end{matrix} \right\} = EK.GS$ wenn $K\alpha = \alpha S$

also $\alpha X' = \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 + EK.GS}$

folglich muſs seyn $KI \gtreqless \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 + EK.GS} - \frac{1}{4}KS$

mithin $KI^2 + IK.KS + \frac{1}{4}KS^2 \gtreqless \frac{1}{4}KS^2 + EK.GS$

somit $KI^2 \gtreqless \left\{ \begin{matrix} EK.GS - IK.KS \\ EK.GS - IK.KG + IK.GS \\ IE.GS - IK.KG \end{matrix} \right.$

demnach $KI(IK+KG) \left\{ \begin{matrix} \\ KI.IG \end{matrix} \right. \gtreqless IE.GS$

also $\begin{matrix} KI : IE \\ OF : FE \\ VN : NG \end{matrix} \left. \begin{matrix} \\ \\ \\ \end{matrix} \right\} \gtreqless \left\{ \begin{matrix} SG \\ MN \end{matrix} \right\} : GI$

folglich $\begin{matrix} VN : NM \\ p : q \end{matrix} \left. \begin{matrix} \\ \\ \end{matrix} \right\} \gtreqless \left\{ \begin{matrix} NG : GI \\ FI : IG \end{matrix} \right.$

Beweis.

Es ist $p : q \gtreqless FI : IG$ (Det.)

also $KI \gtreqless KX'$, wie leicht aus der Determination hervorgehet.

Auch ist EH' : GX'=VG : GS (lib. I. loc. IV. Fall 4.)

also FL' : GX'=p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien KI, IB, EH in Y', Z', W' schneidende gerade Linie OY' ist

$$EW' : GY' \gtrless VG : GS \text{ (lib. I. loc. IV. Fall 4. Zus. 1.)}$$

also $F'Z' : GY' \gtrless p : q$ (wie lib. II. loc. IV. Fall 3. Zus. 1.)

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie KI gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe (verm. lib. I. loc. IV. Fall 4. Zus. 2.) die Linie GE in dem Punkte X so, dafs, wenn die, die Linien EH, FI in H, L schneidende gerade Linie OX gezogen wird,

EH : GX=VG : GS

also FL : GX=p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

mithin ist eine Linie OX gefunden, welche von den Linien FI, GE Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 2. ist.

Fall 5.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FI, GC. (Fig. 92.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. IV. Fall 4. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Determination.

Damit der Punkt X auf IC liege, muſs $KI \leqq KX$ seyn.

Nun ist $KX.XS \left\{ \begin{matrix} \alpha X^2 - \left\{ \begin{matrix} \alpha K^2 \\ \frac{1}{4}KS^2 \end{matrix} \right. \end{matrix} \right\} = EK.GS$

also $\alpha X = \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 + EK.GS}$

folglich muſs seyn $KI \leqq \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 + EK.GS} - \frac{1}{2}KS$

mithin $KI^2 + IK.KS + \frac{1}{4}KS^2 \leqq \frac{1}{4}KS^2 + EK.GS$

somit $KI^2 \leqq \left\{ \begin{matrix} EK.GS - \left\{ \begin{matrix} IK.KS \\ IK(KG-GS) \end{matrix} \right. \\ IE.GS - IK.KG \end{matrix} \right.$

demnach $KI(IK+KG) \left\{ \begin{matrix} \leqq IE.GS \\ KI.IG \end{matrix} \right.$

also $KI : IE \left\{ \begin{matrix} \leqq \left\{ \begin{matrix} SG \\ MN \end{matrix} \right\} : GI \\ OF : FE \\ VN : NG \end{matrix} \right.$

folglich $VN : NM \left\{ \begin{matrix} \leqq NG : GI \\ p : q \end{matrix} \right. \left\{ \begin{matrix} \\ FI : IG \end{matrix} \right.$

Beweis.

Es ist $p : q \gtreqless FI : IG$

also $KI \gtreqless KX$, wie leicht aus der Determination erhellet.

Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. IV. Fall 4.)

folglich $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien IC, IF, EH in Y, Z, W schneidende gerade Linie OY ist

$EW : GY \gtreqless VG : GS$ (lib. I. loc. IV. Fall 4. Zus. 1.)

also $FZ : GY \gtreqless p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.)

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie IC kleinere Verhältnisse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Buchst., wie Fall 4. Zus. 2., wenn man R', X', H', L' statt R, X, H, L setzt.

c.) auf der Linie KI. (Fig. 93—98.) (Loc. XIV.)

Fall 1.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FI, GC. (Fig. 93.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VII. Fall 1. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 4.

Determination.

Damit der Punkt X auf IC liege, muſs $KI \leqq KX$ seyn.

Nun ist $\left.\begin{matrix} KX.XS \\ \alpha X^2 - \left\{\begin{matrix} \alpha K^2 \\ \frac{1}{4}KS^2 \end{matrix}\right. \end{matrix}\right\} = EK.GS$ wenn $K\alpha = \alpha S$

also $\alpha X = \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 + EK.GS}$

folglich muſs seyn $KI \leqq \frac{1}{2}KS + \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 + EK.GS}$

mithin $KI^2 - IK.KS + \frac{1}{4}KS^2 \leqq \frac{1}{4}KS^2 + EK.GS$

somit $KI^2 \leqq \left\{\begin{matrix} EK.GS + \left\{\begin{matrix} IK.KS \\ IK.(KG+GS) \end{matrix}\right. \\ EI.GS + IK.KG \end{matrix}\right.$

demnach $\left.\begin{matrix} KI(IK-KG) \\ KI.IG \end{matrix}\right\} \leqq EI.GS$

also $\left.\begin{matrix} KI : IE \\ OF : FE \\ VN : NG \end{matrix}\right\} \leqq \left\{\begin{matrix} SG \\ MN \end{matrix}\right\} : GI$

folglich $\left.\begin{matrix} VN : NM \\ p : q \end{matrix}\right\} \leqq \left\{\begin{matrix} NG : GI \\ FI : IG \end{matrix}\right.$

Beweis.

Es ist $p : q \leqq FI : IG$ (Det.)

also $KI \leqq KX$, wie leicht aus der Determination hervorgehet.

Auch ist EH : GX = OK : GS (lib. I. loc. VII. Fall 1.)

also FL : GX = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien CI, IF, EH in Y, Z, W schneidende gerade Linie OY ist

$$EW : GY \gtrless VG : GS \text{ (lib. I. loc. VII. Fall 1. Zus. 1.)}$$

also $FZ : GY \gtrless p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.)

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie IC gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie KE in X' so, dafs, wenn die, die Linien EH, FA in H', L' schneidende gerade Linie OX' gezogen wird,

EH' : GX' = VG : GS (lib. I. loc. VII. Fall 1. Zus. 2.)

also FL' : GX' = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.) mithin ist eine Linie OX' gefunden, welche von den Linien FA, GD Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 4. ist.

Fall 2.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FB, GI. (Fig. 94.)

Analysis. Construction.

Buchst., wie zu Fall 1.

Determination.

Damit der Punkt X auf GI liege, mufs $KI \overset{=}{>} KX$ seyn.

Nun ist $KX.XS = EK.GS$

also $K\alpha = \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 + EK.GS}$

wenn $K\alpha = \alpha S$

folglich mufs seyn $KI \overset{=}{>} \frac{1}{2}KS + \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 + EK.GS}$

also $p : q \overset{=}{>} FI : IG$, wie leicht erhellet.

Beweis.

Es ist $p : q \overset{=}{>} FI : IG$ (Det.)

also $KI \overset{=}{>} KX$, wie aus der Determination leicht hervorgehet.

Auch ist $EH : GX = VG : GS$ (lib. I. loc. VII. Fall 1.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien GI, IB, EH in Y, Z, W schneidende gerade Linie OY ist

$EW : GY \overset{>}{<} VG : GS$ (lib. I. loc. VII. Fall 1. Zus. 1.)

also $FZ : GY \overset{>}{<} p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.)

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie IG kleinere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Buchst., wie Fall 1. Zus. 2.

Fall 3.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FB, GK. (Fig. 95. 96.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VII. Fall 2. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Determination.

Vermöge lib. I. loc. VII. Fall 2. Det. mufs seyn

$$GS \leqq GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$$

also $VN : \left\{\begin{matrix} GS \\ NM \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} = \\ > \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} VN \\ FI-OK \end{matrix}\right\} : GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$

$p : q$

Beweis.

Es ist $p : q \left\{\begin{matrix} = \\ > \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} FI-OK \\ VN \end{matrix}\right\} : GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$

$VN : GS$

also $GS \leqq GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$

mithin berührt (Fig. 95.), oder schneidet (Fig. 96.) der Kreis die Linie TU.

Ferner ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VII. Fall 2.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, in Fig. 95. die Linien KS, IB, EH in Y, Z, W schneidende gerade Linie OY ist

EW : GY < VG : GS (lib. I. loc. VII. Fall 2. Zus. 1.)

also FZ : GY < p : q (wie lib. II. loc. III. Fall 4. Zus. 1.) mithin bestimmt der Halbirungspunkt α der Linie KS, für welchen $E\alpha = \sqrt{KE.EG}$, ein gröfseres Verhältnifs, als jeder andere Punkt derselben.

Auch ist, wenn $\gamma\alpha > \alpha Y$, und die, die Linien IB, EH in δ, β schneidende gerade Linie $O\gamma$ gezogen wird, $E\beta : G\gamma > EW : GY$ (lib. I. loc. VII. Fall 2. Zus. 1.)

also $F\delta : G\gamma > FZ : GY$ (wie lib. II. loc. III. Fall 4. Zus. 1.) mithin bestimmen die dem Punkte α näher liegenden Punkte der Linie KS gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in Fig. 96. in dem zweiten Durchschnitte R' des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, welches die Linie KS in X' schneide, so ist, wenn die, die Linien IB, EH in L', H' schneidende gerade Linie OX' gezogen wird,

EH' : GX' = VG : GS (lib. I. loc. VII. Fall 2. Zus. 2.)

also FL' : GX' = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.) mithin ist eine zweite Linie mit der gegebenen Eigenschaft gefunden.

Fall 4.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, GE. (Fig. 93.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., wenn man L', H', X' statt L, H, X setzt, also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VII. Fall 3. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., wenn man R', L', H', X' statt R, L, H, X setzt.

Beweis.

Es ist EH' : GX'=VG : GS (lib. I. loc. VII. Fall 3.)

also FL' : GX'=p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien EK, EH, FA in Y', W', Z' schneidende gerade Linie OY' ist

$$EW' : GY' \gtreqless VG : GS$$ (lib. I. loc. VII. Fall 3. Zus. 1.)

also $$FZ' : GY' \gtreqless p : q$$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.)

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie KE gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' der Linie TU und des Kreises ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie SC in einem Punkte X zwischen C, I, oder in I, oder zwischen S, I,

$$\text{je nachdem } KI \begin{Bmatrix} < \\ = \\ > \end{Bmatrix} KX$$

$$\text{dafs heifst, je nachdem } p:q \begin{Bmatrix} < \\ = \\ > \end{Bmatrix} FI:IG,$$ wie aus Fall 1. und Fall 2. erhellet. Es ist auch, wenn die, die Linien AB, EH' in L, H schneidende gerade Linie OX gezogen wird,

EH : GX=VG : GS (lib. I. loc. VII. Fall 3. Zus. 2.)

also FL : GX=p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

mithin ist eine Linie OX gefunden, welche von den Linien FI, GC, oder FB, GI Segmente in dem gegebenen Verhältnisse abschneidet, welches Fall 1., oder Fall 2. ist.

Fall 5.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FI, GD. (Fig. 97. 98.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VII. Fall 4. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Determination.

Vermöge lib. I. loc. VII. Fall 4. Det. mufs seyn

$$GS \gtreqless GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$$

also $VN : \left\{\begin{matrix} GS \\ NM \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} \gtreqless \\ \gtreqless \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} VN \\ FI-OK \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

$p : q$

Beweis.

Es ist $p : q \left\{\begin{matrix} \gtreqless \\ \gtreqless \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} FI-OK \\ VN \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

$VN : GS$

folglich $GS \gtreqless GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

mithin berührt (Fig. 97.), oder schneidet (Fig. 98.) der Kreis die Linie TU.

Auch ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VII. Fall 4.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, in Fig. 97. die Linien ES, FI, EH in Y, W, Z schneidende gerade Linie OY ist

EW : GY < VG : GS (lib. I. loc. VII. Fall 4. Zus. 1.)

also FZ : GY < p : q (wie lib. II. loc. III. Fall 4. Zus. 1.)

mithin bestimmt der Halbirungspunkt α von KS, für welchen $E\alpha = \sqrt{GE.EK}$, ein gröfseres Verhältnifs, als jeder andere Punkt der Linie ES.

Auch bestimmen die dem Punkte α näher liegenden Punkte gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren, wie Fall 3. Zus. 1.

Zus. 2.

Der zweite Durchschnitt R′ der Linie TU und des Kreises bestimmt, wie Fall 3. Zus. 2., eine zweite Linie OX′ mit der gegebenen Eigenschaft.

3.) auf Ia. (Fig. 99—104.) Der Punkt G liege

A.) auf der Linie IC.

Ist erlediget durch lib. II. loc. IV. V. VI.

B.) auf der Linie ID.

a.) in K.

Ist erlediget durch lib. II. loc. IX.

b.) auf der Verlängerung von IK.

Ist erlediget durch lib. II. loc. XIV.

c.) auf der Linie IK. (Fig. 99—104.) (Loc. X.)

Fall 1.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, ED. (Fig. 99.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VI. Fall 1. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Beweis.

Es ist EH : GX = OK : GS (lib. I. loc. VI. Fall 1.)

also FL : GX = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien KD, FA, EH in Y, Z, W schneidende gerade Linie OY ist

$$EW : GY \gtrless VG : GS$$ (lib. I. loc. VI. Fall 1. Zus. 1.)

also $$FZ : GY \gtrless p : q$$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.)

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie KD gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R' des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe die Linie EI (vermöge lib. I. loc. VI. Fall 1. Zus. 1.) zwischen G, I, oder in I, oder zwischen I, E, je nachdem $KI \left\{ \begin{matrix} > \\ = \\ < \end{matrix} \right\} KX$

dafs heifst, je nachdem $p:q\left\{\begin{matrix}>\\=\\<\end{matrix}\right\}FI:IG$, wie aus Fall 3. und Fall 4. erhellet. Auch ist, wenn die, die Linien AB, EH in L', H' schneidende gerade Linie OX' gezogen wird, $EH':GX'=VG:GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 1. Zus. 1.)

also $FL':GX'=p:q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2) mithin ist eine Linie OX' gefunden, welche von den Linien FB, GI, oder FI, GC Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 3., oder Fall 4. ist.

Fall 2.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FB, GK. (Fig. 100. 101.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VI. Fall 2. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Determination.

Vermöge lib. I. loc. VI. Fall 2. Det. mufs seyn

$$GS\overset{=}{<}GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$$

also $VN:\left\{\begin{matrix}GS\\NM\end{matrix}\right\}\left\{\begin{matrix}=\\>\end{matrix}\right\}\left\{\begin{matrix}VN\\OK-FI\end{matrix}\right\}:GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$

$p:q$

Beweis.

Es ist $p:q\left\{\begin{matrix}=\\>\end{matrix}\right\}\left\{\begin{matrix}OK-FI\\VN\end{matrix}\right\}:GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$

$VN:GS$

also $GS \lessgtr GE+EK-2\sqrt{GE.EK}$

mithin berührt (Fig. 100.), oder schneidet (Fig. 101.) der Kreis die Linie TU.

Ferner ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 1.)

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1.)

Zus. 1.

Für eine andere, in Fig. 100. die Linien GK, IB, EH in Y, Z, W schneidende gerade Linie OY ist

$EW : GY > VG : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 2. Zus. 1.)

also $FZ : GY > p : q$ (wie lib. II. loc. IV. Fall 2. Zus. 1.)

mithin bestimmt der Halbirungspunkt α von KS, für welchen $E\alpha = \sqrt{GE.EK}$, kleinere Verhältnisse, als jeder andere Punkt der Linie KG.

Auch ist, wenn $\gamma\alpha > \alpha Y$, und die, die Linien IB_1 EH in δ, β schneidende gerade Linie $O\gamma$ gezogen wird, $E\beta : G\gamma > EW : GY$ (lib. I. loc. VI. Fall 2. Zus. 1.)

also $F\delta : G\gamma > FZ : GY$ (wie lib. II. loc. IV. Fall 2 Zus. 1.)

mithin bestimmen die dem Punkte α näher liegenden Punkte der Linie GK kleinere Verhältnisse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Der zweite Durchschnitt R′ (Fig. 101.) des Kreises und der Linie TU bestimmt (verm. lib. I. loc. VI. Fall 2. Zus. 2.) eine zweite Linie OX′ mit der gegebenen Eigenschaft.

Fall 3.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FB, GI. (Fig. 99.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., wenn man H', X', L' statt H, X, L setzt, also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VI. Fall 3. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., wenn man R', X', H', L' statt R, X, H, L setzt.

Determination.

Damit der Punkt X' auf GI falle, muſs $KI \gtrless KX'$ seyn.

Nun ist $KX'.X'S \left\{ \begin{matrix} \alpha X'^2 \\ \frac{1}{4}KS^2 \end{matrix} \right\} = EK.GS$ wenn $K\alpha = \alpha S$

somit $\alpha X' = \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 + EK.GS}$

mithin muſs seyn $KI \gtrless \sqrt{\frac{1}{4}KS^2 + EK.GS} - \frac{1}{2}KS$

also $KI^2 + IK.KS + \frac{1}{4}KS^2 \gtrless \frac{1}{4}KS^2 + EK.GS$

folglich $KI^2 \gtrless \left\{ \begin{matrix} EK.GS - \left\{ \begin{matrix} IK.KS \\ IK(SG - GK) \end{matrix} \right. \\ EI.GS + IK.KG \end{matrix} \right.$

mithin $KI(IK - KG) \left\{ \begin{matrix} \\ KI.IG \end{matrix} \right\} \gtrless IE.GS$

somit $KI : IE \left\{ \begin{matrix} \\ OF : FE \\ VN : NG \end{matrix} \right\} \gtrless \left\{ \begin{matrix} SG \\ MN \end{matrix} \right\} : GI$

demnach $VN : NM \left\{ \begin{matrix} = \\ > \\ < \end{matrix} \right\} \begin{matrix} NG \\ FI \end{matrix} : IG$
$p : q$

Beweis.

Es ist $p : q \left\{ \begin{matrix} = \\ > \\ < \end{matrix} \right\} FI : IG$ (Det.)

also $FI \left\{ \begin{matrix} = \\ > \\ < \end{matrix} \right\} KX'$, wie aus der Determination leicht hervorgehet.

Ferner ist $EH' : GX' = VG : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 3.)

also $FL' : GX' = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 2.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien GI, IB, EH in Y', Z', W' schneidende gerade Linie OY' ist

$EH' : GX' \left\{ \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} \right\} VG : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 3. Zus. 1.)

also $FL' : GX' \left\{ \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} \right\} p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 3. Zus. 1.)

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie IG kleinere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte R des Kreises und der Linie TU ein Perpendikel auf TU, so schneidet dasselbe (verm. lib. I. loc. VI. Fall 3. Zus. 2.) die Linie KD in dem Punkte X so, dafs, wenn die, die Linien FA, EH in L, H schneidende gerade Linie OX gezogen wird,

$EH : GX = VG : GS$

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

mithin ist eine Linie OX gefunden, welche von den Linien FA, GD Segmente in dem gegebenen Verhältnifse abschneidet, welches Fall 1. ist.

Fall 4.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FI, GC. (Fig. 102.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VI. Fall 3. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Determination.

Damit der Punkt X auf IE falle, mufs $KI \gtreqless KX$ seyn.

Nun ist $KX.XS = EK.GS$

---

also mufs seyn $p : q \gtreqless FI : IG$, wie aus Fall 3. Det. leicht erhellet.

Beweis.

Es ist $p : q \gtreqless FI : IG$ (Det.)

---

also $KI \gtreqless KX$, wie aus der Determination leicht hervorgehet.

Ferner ist $EH : GX = OK : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 3.)

---

also $FL : GX = p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, die Linien EI, IA, EH in Y, Z, W schneidende gerade Linie OY ist

$EW : GY \gtreqless VG : GS$ (lib. I. loc. VI. Fall 3. Zus. 1.)

---

also $FZ : GY \gtreqless p : q$ (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Zus. 1.)

mithin bestimmen die dem Punkte I näher liegenden Punkte der Linie IE gröfsere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Buchst., wie Fall 3. Zus. 2., wenn X', L', H', R' statt X, L, H, R gesetzt wird.

Fall 5.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, GC. (Fig. 103. 104.)

Analysis.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1., also ist die Aufgabe auf lib. I. loc. VI. Fall 4. reducirt.

Construction.

Buchst., wie zu lib. II. loc. I. Fall 1.

Determination.

Vermöge lib. I. loc. VI. Fall 4. Det. mufs seyn

$$GS \gtreqless GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$$

also $VN : \left\{\begin{matrix} GS \\ NM \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} = \\ < \\ > \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} VN \\ OK-FI \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

$p : q$

Beweis.

Es ist $p:q \left\{\begin{matrix} = \\ < \\ > \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} OK-FI \\ VN \end{matrix}\right\} : GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$ (Det.)

$VN : GS$

also $GS \gtreqless GE+EK+2\sqrt{GE.EK}$

mithin berührt (Fig. 103.), oder schneidet (Fig. 104.) der Kreis die Linie T U.

Auch ist EH : GX = OK : GS (lib. I. loc. IV. Fall 4.)

also FL : GX = p : q (wie lib. II. loc. I. Fall 1. Bew.)

Zus. 1.

Für eine andere, in Fig. 103. die Linien ES, EH, IA in Y, W, Z schneidende gerade Linie OY ist

EW : GY < VG : GS (lib. I. loc. VI. Fall 4. Zus. 1.)

also FZ : GY < p : q (wie lib. II. loc. III. Fall 4. Zus. 1.)

mithin bestimmt der Halbirungspunkt α der Linie KS, für welchen $E\alpha = \sqrt{KE.EG}$, ein gröfseres Verhältnifs, als jeder andere Punkt derselben.

Auch ist, wenn $\gamma\alpha > \alpha Y$, und wenn die, die Linien EH, IA in β, δ schneidende gerade Linie $O\delta$ gezogen wird,

$E\beta : G\gamma < EW : GY$ (lib. I. loc. VI. Fall 4. Zus. 1.)

also $F\delta : G\gamma < FZ : GY$ (wie lib. II. loc. III. Fall 4. Zus. 1.)

mithin bestimmen die dem Punkte α näher liegenden Punkte der Linie ES kleinere Verhältnifse, als die entfernteren.

Zus. 2.

Der zweite Durchschnitt R' der Linie TU und des Kreises bestimmt (vermöge lib. I. loc. VI. Fall 4. Zus. 2.) eine zweite Linie OX' mit der gegebenen Eigenschaft.

ANHANG

zu den

BÜCHERN des APOLLONIUS von PERGA

de sectione rationis.

Aufgabe I. (Fig. 105 — 107.)

Von einem gegebenen Punkte O, welcher sich mit zweyen, der Lage nach gegebenen, nicht durch denselben gezogenen; einander parallelen geraden Linien AB, CD in einer Ebene befindet, eine gerade Linie OX zu ziehen, so dafs die Summe der zwischen den Durchschnittspunkten X, Y mit jenen Linien und zweyen in denselben gegebenen Punkten F, G gelegenen Segmente einer gegebenen geraden Linie α gleich sey.

I. Der Punkt O liegt beiden Parallelen auf derselben Seite.

Fall 1.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FB, GD. (Fig. 105.)

Analysis.

Es sey OX die gesuchte Linie, so ist, wenn die, die Linien GY in E schneidende gerade Linie FO gezogen wird,

$$FX : EY = FO : OE$$

$$\text{also } \left.\begin{matrix} FX+EY \\ FX+GY \\ \alpha \end{matrix}\right\} : EY = FO+OE : OE \quad \left.\begin{matrix} \\ -GE \\ \\ \end{matrix}\right\}$$

folglich ist EY, somit Y, und die Linie OY der Lage nach gegeben.

Construction.

Man ziehe OF, welche der Linie CD in E begegne, und mache $HO=OF$, $GK=\alpha$, $OY \# HK$, so ist die, die Linie FB in X schneidende gerade Linie OY die gesuchte.

Determination.

Damit Y auf ED falle, mufs $\left.\begin{matrix} KG \\ \alpha \end{matrix}\right\} > GE$ seyn.

Beweis.

$$\text{Es ist } \left.\begin{matrix} \alpha \\ KG \end{matrix}\right\} > GE \text{ (Det.)}$$

also liegt Y zwischen E, K.

$$\text{Ferner ist } \left.\begin{matrix} HE \\ FO+OE \\ FX+EY : EY \end{matrix}\right\} : EO \left.\begin{matrix} \\ \\ \\ \end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix} KE \\ KG-GE \\ \alpha-GE \end{matrix}\right\} : EY$$

$$\text{also } FX+EY = \alpha - GE$$

$$\text{folglich } \left.\begin{matrix} FX+EY+GE \\ FX+GY \end{matrix}\right\} = \alpha$$

Zus.

Für eine andere, die Linien FB, GD in W, Z schneidende gerade Linie OZ ist

$$FW \gtrless FX \ , \ GZ \gtrless GY$$

$$\text{also } FW+GZ \gtrless GY+FX$$

mithin bestimmen die dem Punkte G näher liegenden Punkte der Linie ED kleinere Summen, als die entfernteren.

Fall 2.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, GC. (Fig. 106.)

Analysis.

Es sey OX die gesuchte Linie, so ist, wenn die, die Linie CD in E schneidende gerade Linie OF gezogen wird, $FX : EY = FO : OE$

also $\left.\begin{matrix} FX+EY \\ FX+GY \\ \alpha \end{matrix}\right\} : EY = \left.\begin{matrix} FO+OE \\ +EG \end{matrix}\right\} : OE$

mithin ist EY, somit Y, und die Linie QY der Lage nach gegeben.

Construction.

Buchstäblich, wie zu Fall 1.

Determination.

Damit der Punkt Y auf GC falle, mufs $GE \lessgtr EY$ seyn.

Nun ist $FX : EY = FO : OE$
$= FL : EG$

also $\left.\begin{matrix} FX+EY \\ FX+GY \\ \alpha \end{matrix}\right\} : EY = \left.\begin{matrix} FL+EG \\ +EG \end{matrix}\right\} : EG$

folglich mufs $\alpha+EG \gtrless FL+EG$

mithin $\alpha \gtrless LF$ seyn.

Beweis.

Es ist $\alpha \gtrless LF$ (Det.)

also $\alpha + EG \gtrless FL + EG$

Nun ist $FX : EY = FL : EG$

folglich $FX + EY : EY = FL + EG : EG$

mithin $\left.\begin{matrix} FX+EY \\ FO+OE \\ HE \\ KE \\ \alpha+EG \end{matrix}\right\} : \left.\begin{matrix} EY \\ EO \\ \\ EY \\ \\ \end{matrix}\right\} \gtrless \alpha + EG : EG$

somit $EY \gtrless EG$

Ferner ist $\left.\begin{matrix} FX+EY \\ FX+GY+EG \end{matrix}\right\} : EY = KE : EY$

also $FX + GY + EG = KE$

folglich $FX + GY = KG$

$= \alpha$

Zus.

Buchst., wie Fall 1. Zus., wenn GC statt ED gesetzt wird.

Fall 3.

Die Segmente sollen liegen auf den Linien FA, GD. (Fig. 107.)

Analysis.

Es sey OX die gesuchte Linie, so ist, wenn die, die Linie CD in E schneidende gerade Linie FO gezogen wird,

$$FX : EY = FO : OE$$

$$\text{also } \left.\begin{matrix} FX - EY \\ FX + GY \\ \alpha \end{matrix}\right\} - EG \Big\} : EY = FE : EO$$

mithin EY gegeben, somit die Linie OY der Lage nach bestimmt.

Construction.

Man mache $GK = \alpha$, $OY \# FK$.

Determination.

Damit Y auf GE falle, muſs $\left.\begin{matrix} KG \\ \alpha \end{matrix}\right\} > GE$, und

$EY \overset{=}{<} EG$ werden,

$$\text{also } \alpha - EG : EG \overset{=}{<} FE : EO$$

$$\text{folglich } \alpha : EG \overset{=}{<} \left\{\begin{matrix} FO : OE \\ FL : EG, \text{ wenn } OGL \text{ gezogen wird,} \end{matrix}\right.$$

$$\text{mithin } \alpha \overset{=}{<} FL$$

Beweis.

$$\text{Es ist } \left.\begin{matrix} \alpha \\ GK \end{matrix}\right\} > EG$$

also schneidet die Linie OY die Linie EC.

$$\text{Ferner ist } \alpha \overset{=}{<} FL$$

$$\text{also } \alpha : EG \overset{=}{<} \left\{\begin{matrix} FL : EG \\ FO : OE \end{matrix}\right.$$

folglich $\alpha - EG : GE \begin{matrix}=\\<\end{matrix} \begin{cases} FE : EO \\ KE : EY \\ \alpha - EG : EY \end{cases}$

mithin $GE \begin{matrix}=\\>\end{matrix} EY$

Nun ist $FX : EY = FO : OE$

also $\left.\begin{matrix} FX - EY \\ FX + GY - EG \end{matrix}\right\} : EY = \begin{cases} FE : EO \\ KE : EY \\ \alpha - EG : EY \end{cases}$

folglich $FX + GY - EG = \alpha - EG$

mithin $FX + GY = \alpha$

Zus.

Für eine andere, die Linien FL, GE in W, Z schneidende gerade Linie OW ist

$WX : YZ = FO : OE$

also $WX > YZ$

folglich $\left.\begin{matrix} FX \mp WX \\ FW \end{matrix}\right\} + \left\{\begin{matrix} GY \pm YZ \\ GZ \end{matrix}\right. \left\{\begin{matrix}<\\>\end{matrix}\right\} FX + GY$

mithin bestimmen die dem Punkte G näher liegenden Punkte der Linie GE größere Summen, als die entfernteren.

II. Der Punkt O liegt zwischen den Parallelen.

Dieser Fall läßt sich behandeln, wie der vorhergehende.

Aufgabe II.

Von einem gegebenen Punkte, welcher sich mit zweyen der Lage nach gegebenen, nicht durch denselben gezogenen geraden Linien in einer Ebene befindet, eine gerade Linie zu ziehen, so dafs der Unterschied der zwischen den Durchschnittspunkten mit jenen Linien und zweyen in denselben gegebenen Punkten gelegenen Segmente einer gegebenen geraden Linie gleich sey.

Aufgabe III. (Fig. 108. 109.)

Durch einen innerhalb eines der Lage nach gegebenen Winkels ABC gegebenen Punkt O eine gerade Linie XY zu legen, welche von den Schenkeln des gegebenen Winkels Segmente, deren Summen = einer gegebenen geraden Linie α sey, abschneide.

Analysis.

Es sey OX die gesuchte Linie, so ist

$$DY : DO = OE : EX$$

$$\text{also } DY.EX = DO.OE$$

$$\left.\begin{array}{l} \text{Es ist aber } BX+BY \\ BE+EX+BD+DY \end{array}\right\} = \alpha$$

$$\text{also } EX+DY = \alpha-(BE+BD)$$

folglich ist EX (Dat. 86.), somit der Punkt X, und die gerade Linie OX der Lage nach gegeben.

Construction.

Man mache $OD \# BC$, $OE \# AB$, $QB = BD$, $QH = \alpha$, $HG \# AB$, beschreibe über EH einen Halbkreis, mache $BEF = R = EHK$, $FE = EB$, $KH = HG$, ziehe FK, welche den Halbkreis in L erreiche, und errichte in L ein Perpendikel LX auf FK, so ist OX die gesuchte Linie.

Determination.

Damit FK den Halbkreis erreiche, muſs

$$\left.\begin{matrix} FE.HK \\ DO.OE \end{matrix}\right\} \leqq \tfrac{1}{4}EH^2 \text{ seyn}$$

$$\text{also } 4DO.OE \leqq \begin{cases} EH^2 \\ (HQ-QE)^2 \\ (\alpha-(DO+OE))^2 \end{cases}$$

$$\text{folglich } 2\sqrt{DO.OE} \leqq \alpha-(DO+OE)$$

$$\text{mithin } DO+OE+2\sqrt{DO.OE} \leqq \alpha$$

Beweis.

Es ist $DO+OE+2\sqrt{DO.OE} \leqq \alpha$ (Det.)

$$\text{also } 4DO.OE \leqq \begin{cases} (\alpha-(DO+OE))^2 \\ EH^2 \end{cases}$$

$$\text{folglich } FE.HK \leqq \tfrac{1}{4}EH^2$$

mithin berührt (Fig. 108.), oder schneidet (Fig. 109.) FK den Kreis.

Ferner ist $EX.XH = FE.HK$
$= DO.OE$
$= EX.DY$

somit $HX=DY$

also $BX+BY=BH+BD$
$=QH$
$=a$

Zus. 1.

Für eine andere, in Fig. 108. die Linien EC, DA in den Punkten Z, W schneidende gerade Linie OZ ist

$DW.EZ=DO.OE$
$=EX.XH$

also $DW : EX=XH : EZ$

folglich $DW+EZ>EX+\begin{cases}XH\\DY\end{cases}$

mithin $BD+DW+BE+EZ\begin{cases}BW+BZ\end{cases}>\begin{cases}BD+DY+BE+EX\\BY+BX\end{cases}$

demnach bestimmt der Punkt X, für welchen $EX=\sqrt{DO.OE}$, eine kleinere Summe, als jeder andere Punkt der Linie EC.

Ferner ist für die, die Linien EC, DA in q, p schneidende gerade Linie pq, $Eq.Dp=DO.OE$
$=DW.EZ$

also $qE : EZ=WD : Dp$

Ist nun $qE<EZ$

so ist $qE+Dp>WD+DZ$

also $Bp+Dq>BW+DZ$

mithin bestimmen die dem Punkte X näher liegenden Punkte der Linie EC kleinere Summen, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in Fig. 109. in dem zweiten Durchschnitte L' ein Perpendikel L'X' auf FK, so bestimmt dasselbe eine zweite gerade Linie OX' mit der gegebenen Eigenschaft.

Anmerkung zu Aufgabe III. IV. V. VI.

Wenn in Aufgabe III. IV. V. VI. die Segmente nicht von der Spitze des Winkels, sondern von irgend zwey in den Schenkeln desselben gegebenen Punkten an genommen werden sollen, so erhellet leicht, wie diese Aufgaben auf die vorhergehenden sich reduciren lassen.

Aufgabe IV.

Durch einen zwischen den Schenkeln eines der Lage nach gegebenen Winkels gegebenen Punkt eine gerade Linie zu legen, welche von jenen Schenkeln Segmente, deren Unterschied gleich einer gegebenen geraden Linie Y' sey, abschneide.

Aufgabe V. (Fig. 110.)

Durch einen zwischen den Schenkeln eines der Lage nach gegebenen Winkels ABC gegebenen Punkte O eine gerade Linie zu legen, welche von den Schenkeln des Nebenwinkels des gegebenen Winkels Segmente abschneide, deren Summe einer gegebenen geraden Linie α gleich sey.

Aufgabe VII. (Fig. 111.)

Von einem aufserhalb zweyer der Lage nach gegebenen Parallelen AB, CD gegebenen Punkte O eine gerade Linie OX durch dieselben zu ziehen, so dafs die Summe der Quadrate der Segmente FX, EY, welche zwischen den Durchschnittspunkten X, Y und zweyen auf den Parallelen gegebenen Punkten F, G liegen, dem Quadrate einer gegebenen geraden Linie α gleich sey.

Analysis.

OX sey die gesuchte Linie, so ist, wenn OF die Linie GY in E schneidet, $FX : EY = FO : OE$

also $FX^2 : \left\{\begin{matrix} EY^2 \\ (GY-GE)^2 \\ GY^2-2GY.GE+GE^2 \end{matrix}\right\} = FO^2 : OE^2$

Bestimmt man r so, dafs $r : GE = FO : OE$

so ist $FX^2-r^2 : GY^2-2GY.GE = FO^2 : OE^2$

folglich

$$FX^2+GY^2 \left\{\begin{matrix} -r^2 \\ -\alpha^2 \end{matrix}\right\} -GY^2 : \left\{\begin{matrix} FX^2+GY^2 \\ \alpha^2 \end{matrix}\right\} -r^2-2GY.GE = FO^2 : FO^2+OE^2$$

Bestimmt man h so, dafs $\alpha^2-r^2 : h^2 = FO^2 : FO^2+OE^2$

so ist $GY^2 : \left\{\begin{matrix} \left\{\begin{matrix} h^2+r^2-\alpha^2 \\ d^2 \\ 2EG.k \end{matrix}\right\} +2GY.GE \\ 2EG(k+GY) \\ 2EG.AY \end{matrix}\right\} = FO^2 : FO^2+OE^2$ wn. $d^2 = h^2+r^2-\alpha^2$ wenn $2EG : d = d : k$ wenn $AG = k$

folglich $2EG.AY : GY^2 = FO^2+OE^2 : FO^2$

$$BX \gtrless BZ \quad , \quad BY \gtrless BW$$

$$\text{also } BX+BY \gtrless BZ+BW$$

mithin bestimmen die dem Punkte B näher liegenden Punkte kleinere Summen, als die entfernteren.

Zus. 2.

Errichtet man in dem zweiten Durchschnitte L′ des Kreises und der Linie LF ein Perpendikel auf LF, welches der Linie EC in X′ begegne, so ist, wenn die, die Linie BA in Y′ schneidende gerade Linie OX′ gezogen wird,

$$\begin{aligned} EX'.X'H &= HK.EF \\ &= DO.OE \\ &= EX'.DY' \end{aligned}$$

$$\text{also } HX' = DY'$$

$$\begin{aligned} \text{folglich } BY'-BX' &= BD+HX'-BE-EX' \\ &= EQ+EH \\ &= QH \\ &= \alpha \end{aligned}$$

mithin ist auch eine Linie gefunden, welche von den Schenkeln des gegebenen Winkels Segmente abschneidet, deren Unterschied der Linie α gleich ist.

Aufgabe VI.

Durch einen zwischen den Schenkeln eines der Lage nach gegebenen Winkels gegebenen Punkt eine gerade Linie zu ziehen, welche von den Schenkeln des Nebenwinkels jenes Winkels Segmente abschneide, deren Unterschied einer gegebenen geraden Linie gleich sey.

Aufgabe VII. (Fig. 111.)

Von einem aufserhalb zweyer der Lage nach gegebenen Parallelen AB, CD gegebenen Punkte O eine gerade Linie OX durch dieselben zu ziehen, so dafs die Summe der Quadrate der Segmente FX, EY, welche zwischen den Durchschnittspunkten X, Y und zweyen auf den Parallelen gegebenen Punkten F, G liegen, dem Quadrate einer gegebenen geraden Linie α gleich sey.

Analysis.

OX sey die gesuchte Linie, so ist, wenn OF die Linie GY in E schneidet, $FX : EY = FO : OE$

also $FX^2 : \left\{\begin{matrix} EY^2 \\ (GY-GE)^2 \\ GY^2-2GY.GE+GE^2 \end{matrix}\right\} = FO^2 : OE^2$

Bestimmt man r so, dafs $r : GE = FO : OE$

so ist $FX^2-r^2 : GY^2-2GY.GE = FO^2 : OE^2$

folglich

$$FX^2+GY^2\left\{\begin{matrix} -r^2 \\ -\alpha^2 \end{matrix}\right\}-GY^2:\left\{\begin{matrix} FX^2+GY^2 \\ \alpha^2 \end{matrix}\right\}-r^2-2GY.GE = FO^2 : FO^2+OE^2$$

Bestimmt man h so, dafs $\alpha^2-r^2 : h^2 = FO^2 : FO^2+OE^2$

so ist $GY^2 : \left\{\begin{matrix} \left\{\begin{matrix} h^2+r^2-\alpha^2 \\ d^2 \\ 2EG.k \end{matrix}\right\}+2GY.GE \\ 2EG(k+GY) \\ 2EG.AY \end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix} FO^2 : FO^2+OE^2 \\ \text{wn. } d^2 = h^2+r^2-\alpha^2 \\ \text{wenn } 2EG : d = d : k \\ \text{wenn } AG = k \end{matrix}\right.$

folglich $2EG.AY : GY^2 = FO^2+OE^2 : FO^2$

mithin ist die Aufgabe auf Apoll. de Sect. det. lib. I. Pr. 2. Ep. 2. p. 2. reducirt. (Siehe die Bücher des Apollonius de sect. det. von Diesterweg, Bonn, 1822.)

Aufgabe VIII.

Von einem aufserhalb zweyer der Lage nach gegebenen Parallelen gegebenen Punkte eine gerade Linie durch dieselben zu ziehen, so dafs der Unterschied der Quadrate der Segmente, welche zwischen den Durchschnittspunkten und zweyen auf jenen Parallelen gegebenen Punkten liegen, dem Quadrate einer gegebenen geraden Linie gleich sey.

Aufgabe IX. (Fig. 112. 113.)

Durch einen Punkt O, welcher auf der Halbirungslinie eines der Lage nach gegebenen Winkels BAC liegt, eine gerade Linie XY zu legen, welche von den Schenkeln jenes Winkels Segmente abschneide, deren Summe der Quadrate dem Quadrate einer gegebenen geraden Linie α gleich sey.

Analysis.

Es sey XY die gesuchte Linie, sey auch OB # AC, OC # AB, so ist YB : BO = OC : CX

$$\text{also } \left.\begin{matrix} BY.CX \\ (AX-AC)(AY-AB) \end{matrix}\right\} = \begin{matrix} BO.OC \\ AC^2 \end{matrix}$$

mithin ist die Aufgabe auf die andere reducirt: die Seiten eines Rechteckes zu finden, wovon die Diagonale und derjenige Theil seines Flächenraumes gegeben ist, welcher übrig bleibt, wenn man seine Grundlinie und seine Höhe um gegebene gerade Linien abnehmen läfst.

Auflösung.

Man ziehe $OC \# AB$, $OB \# AC$, beschreibe über AC ein Quadrat $ACDF$, mache $DE = \alpha$, lege über DE einen Halbkreis, errichte in dem Mittelpunkte G auf EG ein den Halbkreis in H schneidendes Perpendikel, ziehe DH, $DK \# GH$, mache $DK = DH$, $AL = LD$, beschreibe aus L als Mittelpunkt mit einem Radius $= LK$ einen Kreis, welcher der verlängerten AD in R begegne, und aus R als Mittelpunkt mit einem Radius $= MR$ einen Kreis, welcher die verlängerte AC in X erreiche, und ziehe durch O, X die gerade Linie OX, welche der verlängerten Linie AB in Y begegne, so sind AX, AY die gesuchten Segmente.

Determination.

Damit der aus R mit RM beschriebene Kreis die Linie AC erreiche, muſs, wenn $RQA = R$, seyn $MR \overset{=}{>} RQ$.

Es ist $AR = AL + LR$

$$= \frac{\beta}{\sqrt{2}} + \begin{cases} LK, \text{ wenn } AC = \beta, \\ \sqrt{\tfrac{1}{2}\beta^2 + \tfrac{1}{2}\alpha^2} \end{cases}$$

Auch ist $AR : RQ = 1 : {}_5 \text{ in. } \tfrac{1}{2}R$, $RM = DH$

$$= \sqrt{2} : 1 \qquad = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}$$

also $RQ = \dfrac{\beta + \sqrt{\beta^2 + \alpha^2}}{2}$

also muſs seyn $\dfrac{\beta + \sqrt{\beta^2 + \alpha^2}}{2} \overset{=}{<} \dfrac{\alpha}{\sqrt{2}}$

folglich $\sqrt{\beta^2+\alpha^2} \leqq \alpha\sqrt{2}-\beta$

mithin $\beta^2+\alpha^2 \leqq 2\alpha^2-2\alpha\beta\sqrt{2}+\beta^2$

somit $2\alpha\beta\sqrt{2} \leqq \alpha^2$

demnach $8\beta^2 \leqq \alpha^2$

also $\left.\begin{matrix}2\beta^2\\ AD^2\end{matrix}\right\} \leqq \frac{1}{4}\alpha^2$

folglich $AD \leqq \frac{1}{2}\alpha$

Beweis.

Es ist $AD \leqq \frac{1}{2}\alpha$

also $AD^2 \leqq (\frac{1}{2}\alpha)^2$

folglich $2\beta^2 \leqq \frac{1}{4}\alpha^2$

mithin $8\beta^2 \leqq \alpha^2$

also $RQ \leqq RM$, wie aus der Determination leicht erhellet, folglich berührt (Fig. 112.), oder schneidet (Fig. 113.) der aus R mit RM beschriebene Kreis die Linie AQ.

Ferner ist $AR.RD = RL^2-LD^2 = DK^2 = DH^2 = RM^2 = RX^2$,

wenn RX gezog. wird

also $AR : RX = RX : RD$

folglich $\Delta ARX \sim \Delta DRX$, wenn XD gezogen wird

mithin $\left.\begin{matrix} RAX \\ RAN \end{matrix}\right\} = RXD$

also liegen R, X, A, N auf einem Kreise, dessen Mittelpunkt in P, wenn NP=PX, weil NAX=R.

Zieht man RP, so ist $RPX = 2RAX$
$= R$
$= DGH$

also $\Delta DGH \overset{=}{\sim} \Delta RPX$

folglich $\left.\begin{matrix} RP \\ NQ \end{matrix}\right\} = DG$

mithin $NX = DE$
$= \alpha$

Auch ist $NF : FD = DC : CX$

somit $NF.CX = FD.DC$
$= BO.OC$
$= BY.CX$

also $NF = BY$

folglich $AY = AN$

mithin $AX^2 + AY^2 = AX^2 + AN^2$
$= NX^2$
$= \alpha^2$

Zus. 1.

Zieht man (Fig. 112.) durch einen von X verschiedenen Punkt V auf der Verlängerung des Schenkels AC gerade Linien durch O, D, welche den Verlängerungen der Schenkel AB, AN in Z, W begegnen, so ist

$VW > NX$ (siehe Apoll. de inclinat. von Diesterweg, Bonn, 1823. pag. 25.)

also $\left.\begin{matrix} VW^2 \\ AW^2 \\ AZ^2 \end{matrix}\right\} + AV^2 > \left\{\begin{matrix} NX^2 \\ AY^2 + AX^2 \end{matrix}\right.$

mithin bestimmt der Punkt X eine kleinere Summe der Quadrate der Segmente, als jeder andere Punkt der verlängerten AC.

Auch ist, wenn $tX > XV$, und die, die Schenkel AZ, AW in u, r schneidenden geraden Linien tou, tdr gezogen werden, $tr > VW$ (s. Apoll de incl. l. c.)

also $\left.\begin{matrix} tr^2 \\ tA^2 + Ar^2 \\ Au^2 \end{matrix}\right\} > \left\{\begin{matrix} VW^2 \\ VA^2 + AW^2 \\ AZ^2 \end{matrix}\right.$

mithin bestimmen die dem Punkte X der verlängerten AC näher liegenden Punkte kleinere Quadratsummen, als die entfernteren.

Zus. 2.

In Fig. 113. bestimmt der zweite Durchschnitt X' des Kreises mit der Linie AQ eine zweite Linie mit der gegebenen Eigenschaft.

Zus. 3.

Bezeichnet man mit R' den zweiten Durchschnitt der Linie DE und des aus L als Mittelpunkt mit einem Radius = LK beschriebenen Kreises, und bestimmt man in Beziehung auf R' Linien, wie es für R geschehen ist, so ergiebt sich, dafs dadurch auf den Schenkeln der Nebenwinkel des Winkels BAC Segmente mit derselben Eigenschaft bestimmt werden.

Aufgabe X.

Durch einen auf der Halbirungslinie eines der Lage nach gegebenen Winkels gegebenen Punkt eine gerade Linie zwischen die Schenkel des Winkels zu legen, welche von den Schenkeln des Winkels Segmente abschneide, deren Differenz der Quadrate dem Quadrate einer gegebenen geraden Linie gleich sey.


Fig.6.
E
F
C'
A
B
D


Fig.2.c.
A
W
G
V
W
E
C
P
U
F
X
H
K
R
M


Fig.4.c.
B
V
E
W
G
W
B
T
K
O
M
A
U
P
F
X
Q
H
X
L
R
M'
W
D


E
G
G
P
S
O
Q
H
F
H
Q
L
C
Q
O
S
G
D


Fig.15.
A
R
Q


Fig. 1.
Fig. 2. α.
Fig. 3.
Fig. 4. α.
Fig. 5.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 16.


Fig. 31.


Fig. 33.a.


Fig. 39.a.


Fig. 39.b





Fig. 55.



Fig. 59. a.



Fig. 62.



Fig. 63.

Fig. 66.

Fig. 67.


3.
Fig.


Fig.88.


Fig.92.
Fig.96.

3 2044 014 646 8

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

DUE

FEB 10 1993